

[Корвалдин](#)



Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Фенобарбитал](#)
- [Этилбромизовалерианат](#)
- [Мятное масло](#)
- [Хмелевое масло](#)

Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#) [Апрель](#)
[Госреестр](#)^{МНН МНН МНН МНН} [Википедия](#)^{МНН МНН МНН МНН}
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Комбинированный препарат, действие которого обусловлено свойствами входящих в его состав веществ. Оказывает седативное и спазмолитическое действие. Облегчает наступление естественного сна.

Этиловый эфир α -бромизовалериановой кислоты обладает седативным (подобно эффекту валерианы) и спазмолитическим действием.

Фенобарбитал усиливает седативное влияние других компонентов и оказывает легкое гипотензивное действие.

Масло мяты перечной оказывает рефлекторное вазодилатирующее и спазмолитическое действие.

Показания к применению:

В качестве седативного и сосудорасширяющего средства:

- бессонница (нарушение засыпания);
- кардиалгия;
- синусовая тахикардия;
- невротические состояния;
- вегетативная лабильность;
- раздражительность;
- ипохондрический синдром;
- артериальная гипертензия (ранние стадии).

В качестве спазмолитического средства:

— спазм мускулатуры органов ЖКТ (кишечная и желчная колика).

Относится к болезням:

- [Бессонница](#)
- [Гипертензия](#)
- [Желчная колика](#)
- [Ипохондрия](#)
- [Кардиалгия](#)
- [Кардит](#)
- [Неврит](#)
- [Неврозы](#)
- [Синусит](#)
- [Синусовая тахикардия](#)
- [Спазмы](#)
- [Тахикардия](#)

Противопоказания:

— гиперчувствительность;

— тяжелая печеночная и/или почечная недостаточность.

С *осторожностью*: беременность, период лактации.

Способ применения и дозы:

Внутрь, перед приемом пищи, по 15-30 кап, предварительно растворив в небольшом количестве (30-50 мл) воды, 2-3 раза в день. Разовая доза при необходимости (например при тахикардии) может быть увеличена до 40-50 кап.

Детям - по 3-15 кап/сут (в зависимости от возраста и клинической картины заболевания).

Длительность применения препарата устанавливается врачом индивидуально.

Побочное действие:

Сонливость, головокружение, снижение способности к концентрации внимания, аллергические реакции.

При длительном приеме - хроническое отравление бромом (депрессия, апатия, ринит, конъюнктивит, геморрагический диатез, нарушения координации движений); лекарственная зависимость.

Применение при беременности и кормлении грудью:

С *осторожностью*: беременность, период лактации.

Особые указания и меры предосторожности:

Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами

В период лечения необходимо соблюдать осторожность при вождении автотранспорта и занятии другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

При нарушениях функции почек

Применение препарата противопоказано при тяжелой почечной недостаточности.

При нарушениях функции печени

Корвалдин

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

Применение препарата противопоказано при тяжелой печеночной недостаточности.

Применение в детском возрасте

Применение возможно согласно режиму дозирования.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: <http://drugs.thead.ru/Korvaldin>