Корвалдин



Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- Фенобарбитал
- Этилбромизовалерианат
- Мятное масло
- Хмелевое масло

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр[МНН] [МНН] [МНН] [МНН] Википедия[МНН] [МНН] [МНН] [МНН] Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Комбинированный препарат, действие которого обусловлено свойствами входящих в его состав веществ. Оказывает седативное и спазмолитическое действие. Облегчает наступление естественного сна.

Этиловый эфир α-бромизовалериановой кислоты обладает седативным (подобно эффекту валерианы) и спазмолитическим действием.

Фенобарбитал усиливает седативное влияние других компонентов и оказывает легкое гипотензивное действие.

Масло мяты перечной оказывает рефлекторное вазодилатирующее и спазмолитическое действие.

Показания к применению:

В качестве седативного и сосудорасширяющего средства:

— бессонница (нарушение засыпания);

— кардиалгия;

— синусовая тахикардия;

— невротические состояния;

— вегетативная лабильность;

— раздражительность;

— ипохондрический синдром;

— артериальная гипертензия (ранние стадии).

В качестве спазмолитического средства:

— спазм мускулатуры органов ЖКТ (кишечная и желчная колика).

Относится к болезням:

- Бессонница
- Гипертензия
- Желчная колика
- Ипохондрия
- Кардиалгия
- Кардит
- Неврит
- Неврозы
- Синусит
- Синусовая тахикардия
- Спазмы
- Тахикардия

Противопоказания:

— гиперчувствительность;

— тяжелая печеночная и/или почечная недостаточность.

С *осторожностью*: беременность, период лактации.

Способ применения и дозы:

Внутрь, перед приемом пищи, по 15-30 кап, предварительно растворив в небольшом количестве (30-50 мл) воды, 2-3 раза в день. Разовая доза при необходимости (например при тахикардии) может быть увеличена до 40-50 кап.

Детям - по 3-15 кап/сут (в зависимости от возраста и клинической картины заболевания).

Длительность применения препарата устанавливается врачом индивидуально.

Побочное действие:

Сонливость, головокружение, снижение способности к концентрации внимания, аллергические реакции.

При длительном приеме - хроническое отравление бромом (депрессия, апатия, ринит, конъюнктивит, геморрагический диатез, нарушения координации движений); лекарственная зависимость.

Применение при беременности и кормлении грудью:

С *осторожностью*: беременность, период лактации.

Особые указания и меры предосторожности:

Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами

В период лечения необходимо соблюдать осторожность при вождении автотранспорта и занятии другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

При нарушениях функции почек

Применение препарата противопоказано при тяжелой почечной недостаточности.

При нарушениях функции печени

Применение препарата противопоказано при тяжелой печеночной недостаточности.

Применение в детском возрасте

Применение возможно согласно режиму дозирования.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Korvaldin