

## [Корвалол](#)



### **Код АТХ:**

- [N05CB02](#)

### **Международное непатентованное название (Действующее вещество):**

- [Фенобарбитал](#)
- [Этилбромизовалерианат](#)

### **Полезные ссылки:**

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)  
[Госреестр](#)<sup>МНН</sup> [МНН](#) [Википедия](#)<sup>МНН</sup> [МНН](#)  
[PLC VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)<sup>англ</sup>

### **Форма выпуска:**

Капли для приема внутрь во флаконах-капельницах темного стекла по 15 или 25 мл; в пачке картонной 1 флакон-капельница.

### **Состав:**

#### **100 мл капель содержат**

*Активные вещества:* этиловый эфир альфа-бромизовалериановой кислоты 2 г, фенобарбитал 1,826 г, спирт этиловый 95% 79 мл

*Вспомогательные вещества:* натр едкий, масло мяты перечной, вода очищенная.

### **Описание:**

Прозрачная бесцветная жидкость с ароматным специфическим запахом.

## Фармакотерапевтическая группа:

- [Нейротропные средства](#)

## Фармакологические свойства:

### Фармакодинамика

Комбинированный препарат. Фенобарбитал обладает седативным и мягким снотворным эффектом. Способствует снижению возбуждения ЦНС и облегчает наступление естественного сна. Этилбромизовалерианат оказывает седативное и спазмолитическое действие. Масло мяты перечной обладает рефлекторной сосудорасширяющей и спазмолитической активностью.

## Показания к применению:

В качестве седативного и сосудорасширяющего средства при следующих заболеваниях:

- функциональные расстройства сердечно-сосудистой системы (кардиалгия, синусовая тахикардия, повышение АД);
- бессонница (нарушение засыпания);
- невротические состояния;
- вегетативная лабильность;
- раздражительность;
- ипохондрический синдром.

В качестве спазмолитического средства:

- спазм мускулатуры органов ЖКТ (кишечная и желчная колика).

## Относится к болезням:

- [Артериальная гипертензия](#)
- [Бессонница](#)
- [Гипертония](#)
- [Кардиалгия](#)
- [Синусовая тахикардия](#)

## Противопоказания:

Препарат не должен применяться при наличии какого-либо из состояний, перечисленных ниже:

- гиперчувствительность;
- тяжелая печеночная и/или почечная недостаточность;
- период лактации (грудное вскармливание).

## Способ применения и дозы:

Внутрь, перед приемом пищи, по 15-30 капель, предварительно растворив в небольшом количестве (30-50 мл) воды, 2-3 раза/сут. Разовая доза при необходимости (например при тахикардии) может быть увеличена до 40-50 капель.

Детям - по 3-15 капель/сут (в зависимости от возраста и клинической картины заболевания).

Длительность применения препарата устанавливается врачом индивидуально.

## Побочное действие:

## **Корвалол**

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

---

Сонливость, головокружение, снижение способности к концентрации внимания, аллергические реакции.

При длительном приеме - хроническое отравление бромом (депрессия, апатия, ринит, конъюнктивит, геморрагический диатез, нарушения координации движений); лекарственная зависимость.

### **Передозировка:**

До настоящего времени сведений о передозировке препарата нет.

### **Применение при беременности и кормлении грудью:**

Назначение препарата в период беременности возможно только по строгим показаниям. При необходимости назначения препарата в период кормления грудью следует решить вопрос о прекращении грудного вскармливания.

### **Взаимодействие с другими лекарственными средствами:**

Клинически значимого взаимодействия препарата с другими лекарственными препаратами не установлено.

### **Особые указания и меры предосторожности:**

Препарат содержит 79 объемных процентов этанола и фенобарбитал, поэтому пациентам, принимающим Корвалол, не рекомендуется заниматься деятельностью, связанной с повышенным вниманием и требующей быстроты психических и двигательных реакций.

При длительном применении препарата возможно формирование лекарственной зависимости; возможно накопление брома в организме и развитие отравления им.

При проявлении каких-либо побочных (необычных) эффектов необходимо сообщить о них лечащему врачу.

### **Условия хранения:**

В защищенном от света месте, при температуре 10-25 °С.

### **Срок годности:**

3 года.

### **Условия отпуска в аптеке:**

Без рецепта.

**Источник:** <http://drugs.thead.ru/Korvalol>