

[Корвалол](#)



Код АТХ:

- [N05CB02](#)

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Фенобарбитал](#)
- [Этилбромизовалерианат](#)

Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)
[Госреестр](#)^{МНН} [МНН](#) [Википедия](#)^{МНН} [МНН](#)
[PLC VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

Капли для приема внутрь во флаконах-капельницах темного стекла по 15 или 25 мл; в пачке картонной 1 флакон-капельница.

Состав:

100 мл капель содержат

Активные вещества: этиловый эфир альфа-бромизовалериановой кислоты 2 г, фенобарбитал 1,826 г, спирт этиловый 95% 79 мл

Вспомогательные вещества: натр едкий, масло мяты перечной, вода очищенная.

Описание:

Прозрачная бесцветная жидкость с ароматным специфическим запахом.

Фармакотерапевтическая группа:

- [Нейротропные средства](#)

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Комбинированный препарат. Фенобарбитал обладает седативным и мягким снотворным эффектом. Способствует снижению возбуждения ЦНС и облегчает наступление естественного сна. Этилбромизовалерианат оказывает седативное и спазмолитическое действие. Масло мяты перечной обладает рефлекторной сосудорасширяющей и спазмолитической активностью.

Показания к применению:

В качестве седативного и сосудорасширяющего средства при следующих заболеваниях:

- функциональные расстройства сердечно-сосудистой системы (кардиалгия, синусовая тахикардия, повышение АД);
- бессонница (нарушение засыпания);
- невротические состояния;
- вегетативная лабильность;
- раздражительность;
- ипохондрический синдром.

В качестве спазмолитического средства:

- спазм мускулатуры органов ЖКТ (кишечная и желчная колика).

Относится к болезням:

- [Артериальная гипертензия](#)
- [Бессонница](#)
- [Гипертония](#)
- [Кардиалгия](#)
- [Синусовая тахикардия](#)

Противопоказания:

Препарат не должен применяться при наличии какого-либо из состояний, перечисленных ниже:

- гиперчувствительность;
- тяжелая печеночная и/или почечная недостаточность;
- период лактации (грудное вскармливание).

Способ применения и дозы:

Внутрь, перед приемом пищи, по 15-30 капель, предварительно растворив в небольшом количестве (30-50 мл) воды, 2-3 раза/сут. Разовая доза при необходимости (например при тахикардии) может быть увеличена до 40-50 капель.

Детям - по 3-15 капель/сут (в зависимости от возраста и клинической картины заболевания).

Длительность применения препарата устанавливается врачом индивидуально.

Побочное действие:

Корвалол

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

Сонливость, головокружение, снижение способности к концентрации внимания, аллергические реакции.

При длительном приеме - хроническое отравление бромом (депрессия, апатия, ринит, конъюнктивит, геморрагический диатез, нарушения координации движений); лекарственная зависимость.

Передозировка:

До настоящего времени сведений о передозировке препарата нет.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Назначение препарата в период беременности возможно только по строгим показаниям. При необходимости назначения препарата в период кормления грудью следует решить вопрос о прекращении грудного вскармливания.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Клинически значимого взаимодействия препарата с другими лекарственными препаратами не установлено.

Особые указания и меры предосторожности:

Препарат содержит 79 объемных процентов этанола и фенобарбитал, поэтому пациентам, принимающим Корвалол, не рекомендуется заниматься деятельностью, связанной с повышенным вниманием и требующей быстроты психических и двигательных реакций.

При длительном применении препарата возможно формирование лекарственной зависимости; возможно накопление брома в организме и развитие отравления им.

При проявлении каких-либо побочных (необычных) эффектов необходимо сообщить о них лечащему врачу.

Условия хранения:

В защищенном от света месте, при температуре 10-25 °С.

Срок годности:

3 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: <http://drugs.thead.ru/Korvalol>