Корвалол

Код АТХ:

- N05CB02

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- Фенобарбитал
- Этилбромизовалерианат

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр[МНН] [МНН] Википедия[МНН] [МНН]
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

Капли для приема внутрь во флаконах-капельницах темного стекла по 15 или 25 мл; в пачке картонной 1 флакон-капельница.

Состав:

100 мл капель содержат

Активные вещества: этиловый эфир альфа-бромизовалериановой кислоты 2 г, фенобарбитал 1,826 г, спирт этиловый 95% 79 мл

Вспомогательные вещества: натр едкий, масло мяты перечной, вода очищенная.

Описание:

Прозрачная бесцветная жидкость с ароматным специфическим запахом.

Фармакотерапевтическая группа:

- Нейротропные средства

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Комбинированный препарат. Фенобарбитал обладает седативным и мягким снотворным эффектом. Способствует снижению возбуждения ЦНС и облегчает наступление естественного сна. Этилбромизовалерианат оказывает седативное и спазмолитическое действие. Масло мяты перечной обладает рефлекторной сосудорасширяющей и спазмолитической активностью.

Показания к применению:

В качестве седативного и сосудорасширяющего средства при следующих заболеваниях:

— функциональные расстройства сердечно-сосудистой системы (кардиалгия, синусовая тахикардия, повышение АД);

— бессонница (нарушение засыпания);

— невротические состояния;

— вегетативная лабильность;

— раздражительность;

— ипохондрический синдром.

В качестве спазмолитического средства:

— спазм мускулатуры органов ЖКТ (кишечная и желчная колика).

Относится к болезням:

- Артериальная гипертензия
- Бессонница
- Гипертония
- Кардиалгия
- Синусовая тахикардия

Противопоказания:

Препарат не должен применяться при наличии какого-либо из состояний, перечисленных ниже:

— гиперчувствительность;

— тяжелая печеночная и/или почечная недостаточность;

— период лактации (грудное вскармливание).

Способ применения и дозы:

Внутрь, перед приемом пищи, по 15-30 капель, предварительно растворив в небольшом количестве (30-50 мл) воды, 2-3 раза/сут. Разовая доза при необходимости (например при тахикардии) может быть увеличена до 40-50 капель.

Детям - по 3-15 капель/сут (в зависимости от возраста и клинической картины заболевания).

Длительность применения препарата устанавливается врачом индивидуально.

Побочное действие:

Сонливость, головокружение, снижение способности к концентрации внимания, аллергические реакции.

При длительном приеме - хроническое отравление бромом (депрессия, апатия, ринит, конъюнктивит, геморрагический диатез, нарушения координации движений); лекарственная зависимость.

Передозировка:

До настоящего времени сведений о передозировке препарата нет.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Назначение препарата в период беременности возможно только по строгим показаниям. При необходимости назначения препарата в период кормления грудью следует решить вопрос о прекращении грудного вскармливания.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Клинически значимого взаимодействия препарата с другими лекарственными препаратами не установлено.

Особые указания и меры предосторожности:

Препарат содержит 79 объемных процентов этанола и фенобарбитал, поэтому пациентам, принимающим Корвалол, не рекомендуется заниматься деятельностью, связанной с повышенным вниманием и требующей быстроты психических и двигательных реакций.

При длительном применении препарата возможно формирование лекарственной зависимости; возможно накопление брома в организме и развитие отравления им.

При проявлении каких-либо побочных (необычных) эффектов необходимо сообщить о них лечащему врачу.

Условия хранения:

В защищенном от света месте, при температуре 10–25 °C.

Срок годности:

3 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Korvalol