

## Корвалол Фито (таблетки)



### **Международное непатентованное название (Действующее вещество):**

- [Мяты перечной листьев масло](#)
- [Пустырника травы экстракт](#)
- [Этилбромизовалерианат](#)

### **Полезные ссылки:**

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)  
[Госреестр](#)<sup>МНН МНН МНН</sup> [Википедия](#)<sup>МНН МНН МНН</sup>  
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)<sup>англ</sup>

### **Форма выпуска:**

#### **Форма выпуска, описание и состав**

◊ **Таблетки** круглые, плоскоцилиндрические, светло-коричневого цвета с вкраплениями более светлого и более темного цвета, с фаской и риской, со слабым характерным запахом.

	<b>1 таб.</b>
экстракт пустырника (пустырника экстракт сухой)	28 мг
этилбромизовалерианат (этиловый эфир альфа-бромизовалериановой кислоты)	16.4 мг
масло мяты перечной	1.16 мг

Вспомогательные вещества: лактоза (лактозы моногидрат) - 158.42 мг, бетадекс (бетациклодекстрин) - 111.1 мг, крахмал картофельный - 71.12 мг, магния алюмогидроксид силикат (Неусилин UFL 2) - 8 мг, тальк - 4 мг, магния стеарат - 1.8 мг.

- 10 шт. - упаковки контурные ячейковые (1) - пачки картонные.
- 10 шт. - упаковки контурные ячейковые (2) - пачки картонные.
- 10 шт. - упаковки контурные ячейковые (3) - пачки картонные.
- 10 шт. - упаковки контурные ячейковые (4) - пачки картонные.
- 10 шт. - упаковки контурные ячейковые (5) - пачки картонные.

### **Фармакологические свойства:**

#### **Фармакодинамика**

Комбинированный препарат, действие которого обусловлено свойствами входящих в него веществ. Оказывает седативное и спазмолитическое действие, умеренное кардиотоническое действие, обладает умеренными гипотензивными свойствами.

*Этилбромизовалерианат* обладает седативным и спазмолитическим действием, обусловленным раздражением преимущественно рецепторов полости рта и носоглотки, снижением рефлекторной возбудимости в центральных отделах нервной системы и усилением торможения в нейронах коры и подкорковых структурах головного мозга, а также снижением активности сосудодвигательного центра и прямым местным спазмолитическим действием на гладкую мускулатуру.

## Корвалол Фито (таблетки)

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

---

*Пустырника трава* обладает выраженным седативным, умеренным кардиотоническим действием, умеренным гипотензивным действием.

*Мяты перечной масло* оказывает рефлекторное вазодилатирующее, спазмолитическое, незначительное желчегонное, антисептическое действие. Механизм действия связан со способностью раздражать "холодовые" рецепторы слизистой оболочки полости рта и рефлекторно расширять преимущественно сосуды сердца и головного мозга. Устраняет явления метеоризма за счет раздражения рецепторов слизистой оболочки ЖКТ, усиливая перистальтику кишечника.

### Показания к применению:

Нарушения сна, невротоподобные состояния, сопровождающихся повышенной раздражительностью и возбудимостью, состояния возбуждения с выраженными вегетативными проявлениями; в качестве спазмолитического средства при спазмах кишечника, а также в качестве симптоматического (успокаивающего и сосудорасширяющего) средства при функциональных расстройствах сердечно-сосудистой системы.

### Относится к болезням:

- [Неврит](#)
- [Неврозы](#)
- [Спазмы](#)

### Противопоказания:

Тяжелые нарушения функции почек и/или печени; эрозивно-язвенные поражения ЖКТ (фаза обострения); беременность; период лактации; возраст до 18 лет (эффективность и безопасность не установлены); повышенная чувствительность к компонентам препарата.

*С осторожностью:* нарушения функции печени и/или почек; эпилепсия; алкоголизм; пациенты из группы высокого риска, в т.ч. с заболеваниями печени, черепно-мозговыми травмами, заболеваниями головного мозга.

### Способ применения и дозы:

Препарат принимают внутрь, до еды, предварительно растворив в небольшом количестве (30-40 мл) воды.

**Взрослым** назначают по 30 капель 3 раза/сут.

Курс лечения - 28 дней. Продолжительность приема может быть увеличена по рекомендации врача.

### Побочное действие:

*Со стороны иммунной системы:* аллергические реакции.

*Со стороны нервной системы:* сонливость, слабость, головокружение, снижение способности к концентрации внимания.

*Со стороны сердечно-сосудистой системы:* замедление сердечного ритма.

*Со стороны пищеварительной системы:* диспепсия.

Указанные явления проходят при снижении дозы препарата или прекращении приема препарата.

При *длительном применении препарата в высоких дозах* возможно развитие лекарственной зависимости, а также накопление брома в организме и развитие явлений бромизма, проявлениями которого являются депрессивное настроение, апатия, ринит, конъюнктивит, геморрагический диатез, нарушение координации движений.

### Применение при беременности и кормлении грудью:

Применение препарата при беременности противопоказано.

При необходимости применения препарата в период лактации следует решать вопрос о прекращении грудного

вскармливания.

## **Взаимодействие с другими лекарственными средствами:**

При одновременном применении препарата с *лекарственными средствами, угнетающими деятельность ЦНС (седативные, снотворные, нейролептики, транквилизаторы)*, возможно взаимное усиление эффектов.

Препарат усиливает действие *спазмолитических, анальгезирующих средств*.

*Этанол* усиливает эффект препарата и его токсичность.

## **Особые указания и меры предосторожности:**

Не рекомендуется длительное применение препарата в высоких дозах, в связи с возможным токсическим действием при кумуляции брома в организме.

Во время применения препарата не следует употреблять алкоголь.

Препарат содержит 47.5% этанола, таким образом при приеме внутрь в максимальной разовой дозе препарата содержание этанола составляет 0.308 г, в максимальной суточной дозе - 0.923 г.

*Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами*

В связи с возможностью возникновения головокружения, снижения концентрации внимания и других побочных эффектов, связанных с приемом препарата, в период лечения пациентам рекомендуется воздержаться от управления автотранспортом и занятий другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных и двигательных реакций.

**Источник:** [http://drugs.thead.ru/Korvalol\\_Fito\\_tabletki](http://drugs.thead.ru/Korvalol_Fito_tabletki)