

Кралонин



Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)
[Госреестр](#) [Википедия](#)
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

◇ **Капли для приема внутрь гомеопатические** темного красно-коричневого цвета, прозрачные, с ароматным запахом; допускается выпадение незначительного осадка.

	100 г
Crataegus (кратэгус) Ø	70 г
Spigelia anthelmia (Spigelia) (спигелия антельмия (спигелия)) D2	1 г
Kalium carbonicum (калиум карбоникум) D3	1 г

Вспомогательные вещества: этанол (около 45 об.%).

30 мл - флакон-капельницы темного стекла (1) - пачки картонные.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Многокомпонентный гомеопатический препарат, действие которого обусловлено компонентами, входящими в его состав.

Показания к применению:

— ишемическая болезнь сердца: профилактика приступов стабильной стенокардии.

Указание: При болях в области груди, отдающих в руку, эпигастральную область или в шею, при удушье, а также в том случае, если жалобы сопровождаются состояниями тревоги, рвотой или приступами потоотделения, и улучшение не наступает в течение получаса, необходимо вызвать неотложную помощь.

Относится к болезням:

- [Стенокардия](#)
- [Удушье](#)

Противопоказания:

— детский возраст до 12 лет.

Применение лекарственного средства при сердечной недостаточности возможно только после консультации с врачом.

С осторожностью: заболевания печени, алкоголизм, черепно-мозговая травма и заболевания головного мозга.

Способ применения и дозы:

По 10-20 капель, растворив в 100 мл воды, 3 раза в день. Коррекцию дозы проводит врач. Курс лечения 2-3 недели.

При недостаточной эффективности препарата необходимо обратиться к врачу. Гомеопатические препараты не должны применяться в течение длительного времени без консультации с врачом.

Побочное действие:

Возможны аллергические реакции.

В отдельных случаях могут наблюдаться временное покраснение кожи лица, тахикардия и увеличение частоты пульса, отек, а также головокружение и легкие болевые ощущения в области желудка.

Передозировка:

Случаи передозировки до настоящего времени не были зарегистрированы.

Применение при беременности и кормлении грудью:

В связи с отсутствием клинических данных применение при беременности и в период лактации не рекомендуется.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Назначение комплексных гомеопатических препаратов не исключает использование других лекарственных средств, применяемых при данном заболевании.

Данное лекарственное средство не заменяет препаратов, назначенных лечащим врачом.

Особые указания и меры предосторожности:

При приеме гомеопатических лекарственных средств в отдельных случаях могут временно обостряться имеющиеся симптомы (первичное ухудшение). В этом случае следует прервать прием препарата и обратиться к лечащему врачу.

При отсутствии терапевтического эффекта в течение 2-3 недель, а также появлении побочных эффектов следует обратиться к врачу.

Максимальная разовая доза препарата (20 капель) содержит около 0.24 г абсолютного спирта этилового (этанола). Максимальная суточная доза препарата (60 капель) содержит около 0.72 г абсолютного спирта этилового (этанола).

Бережь от перегрева! Флакон следует закрывать сразу после приема препарата.

Использование в педиатрии

Поскольку не существует достаточно подтвержденных данных по применению в педиатрии, не следует применять для детей в возрасте до 12 лет.

Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами

Препарат не оказывает влияние на выполнение потенциально опасных видов деятельности, требующих особого внимания и быстрых реакций (управление автомобилем и другими транспортными средствами, работа с движущимися механизмами, работа диспетчера и оператора и т.п.).

Кралонин

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

При нарушениях функции печени

С осторожностью при заболеваниях печени

Применение в детском возрасте

Поскольку не существует достаточно подтвержденных данных по применению в педиатрии, не следует применять для детей в возрасте до 12 лет.

Условия хранения:

Хранить в сухом, защищенном от света месте при температуре от 15°C до 25°C. Хранить в недоступном для детей месте!

Срок годности:

3 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: <http://drugs.thead.ru/Kralonin>