Крапивы Двудомной Листья



Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр Википедия Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

Форма выпуска, описание и состав

Сырье растительное измельченное от зеленого до темно-зеленого с серо-зелеными, белыми, желто-белыми и коричневыми вкраплениями; в виде смеси кусочков листовых пластинок, черешков, редко - цветоносцев, стеблей, отдельных цветков и семян, проходящих сквозь сито с отверстиями размером 7 мм; запах слабый, вкус водного извлечения горьковатый.

	1 пачка
листья крапивы двудомной	50 г

50 г - пакеты (1) - пачки картонные.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Средство растительного происхождения. Свежие листья крапивы содержат гистамин, серотонин, ацетилхолин, муравьиную кислоту, лейкотриены, флавоноиды (в т.ч. рутин, изокверцитрин, астрагалин, камферол-3-О-рутинозид), кремниевая кислота, эфирное масло, ионы калия, нитраты. Сок крапивы оказывает диуретическое действие, в ряде исследований показана эффективность при ревматизме. Гемостатические свойства листьев крапивы связаны с содержанием витамина К. Кроме того, биологически активные вещества листьев крапивы способствуют стимуляции эритропоэза, нормализации липидного обмена, оказывают желчегонное и противовоспалительное действие, способствуют улучшению процессов регенерации. Галеновы препараты крапивы повышают сократительную способность гладкой мускулатуры матки.

В корне крапивы содержатся стероиды (в т.ч. бета-ситостерол, стигмастерол, кампестерол, стигмаст-4-ен-3-он), лецитины, полисахариды (глюканы, глюкогалактуронаны, кислые водорастворимые арабиногалактаны с иммуностимулирующим эффектом), гидроксикумарины (скополетин), лигнаны, керамиды. Показано, что корень крапивы способствует увеличению объема мочи, увеличивает максимальный ток мочи и уменьшает количество остаточной мочи.

Показания к применению:

В составе комбинированной терапии: инфекции мочевого тракта, мочекаменная болезнь, ревматизм, кровотечения, атеросклероз, железодефицитная анемия, симптоматическое лечение при увеличении предстательной железы.

Относится к болезням:

- Атеросклероз
- Железодефицитная анемия
- Инфекции
- Мочекаменная болезнь
- Ревматизм

Противопоказания:

Задержка жидкости в организме вследствие нарушений деятельности сердца или функции почек.

Способ применения и дозы:

Принимают внутрь в виде приготовленного настоя 3 раза/сут.

Побочное действие:

Редко: аллергические реакции.

При применении препаратов корня крапивы редко - слабовыраженные нежелательные явления со стороны ЖКТ.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

При одновременном применении экстракта листьев крапивы и диклофенака возможно усиление действия последнего.

Особые указания и меры предосторожности:

Приготовленный настой хранить в прохладном месте не более 2 сут.

Источник: http://drugs.thead.ru/Krapivy_Dvudomnoy_Listya