

Крапивы листья



Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Крапивы листья](#)

Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#) [Апрель](#)
[Госреестр](#)^{МНН} [Википедия](#)^{МНН}
[РЛС](#) [VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

♦ Сырье растительное измельченное	1 пачка
листья крапивы двудомной	50 г

пачки картонные с вложением пакетов бумажных.

Фармакотерапевтическая группа:

- [Гематотропные средства](#)
- [Ненаркотические анальгетики, включая нестероидные и другие противовоспалительные средства](#)
- [Органотропные средства](#)

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Настой листьев крапивы оказывает кровоостанавливающее действие, повышает тонус матки.

Показания к применению:

Обильные менструальные кровотечения в составе комплексной терапии, необильные кровотечения в посткоагуляционный период лечения эрозии шейки матки.

Противопоказания:

Индивидуальная непереносимость, гиперкоагуляция, кровотечения (при заболеваниях, требующих оперативного вмешательства и опухолях); беременность; детский возраст до 12 лет.

С осторожностью применять при почечной недостаточности.

Способ применения и дозы:

Около 10 г (2 столовые ложки) листьев помещают в эмалированную посуду, заливают 200 мл (1 стакан) горячей кипяченой воды, закрывают крышкой и настаивают на кипящей водяной бане 15 мин, охлаждают при комнатной температуре 45 мин, процеживают, оставшееся сырье отжимают. Объем полученного настоя доводят кипяченой водой до 200 мл.

Принимают внутрь в виде настоя взрослые и дети с 12 лет по 1 столовой ложке 3-4 раза в день за 30 мин до еды.

Перед применением настой рекомендуется взбалтывать.

Побочное действие:

Возможны аллергические реакции, гиперкоагуляция.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Не применять во время беременности!

Возможно применение в период лактации.

Особые указания и меры предосторожности:

При нарушениях функции почек

С осторожностью применять при почечной недостаточности.

Применение в детском возрасте

Противопоказан в детском возрасте до 12 лет.

Условия хранения:

В сухом, защищенном от света месте; приготовленный настой - в прохладном месте не более 2-х сут. Хранить в недоступном для детей месте.

Не применять по истечении срока годности.

Срок годности:

2 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Krapivy_Listya