

[Крапивы листья \(порошок\)](#)



Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Крапивы листья](#)

Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#) [Апрель](#)
[Госреестр](#)^{МНН} [Википедия](#)^{МНН}
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Фармакотерапевтическая группа:

- [Гематотропные средства](#)
- [Ненаркотические анальгетики, включая нестероидные и другие противовоспалительные средства](#)
- [Органотропные средства](#)

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Средство растительного происхождения. Свежие листья крапивы содержат гистамин, серотонин, ацетилхолин, муравьиную кислоту, лейкотриены, флавоноиды (в т.ч. рутин, изоверцитрин, астрагалин, камферол-3-О-рутинозид), кремниевая кислота, эфирное масло, ионы калия, нитраты. Сок крапивы оказывает диуретическое действие, в ряде исследований показана эффективность при ревматизме. Гемостатические свойства листьев крапивы связаны с содержанием витамина К. Кроме того, биологически активные вещества листьев крапивы способствуют стимуляции эритропоэза, нормализации липидного обмена, оказывают желчегонное и противовоспалительное действие, способствуют улучшению процессов регенерации. Галеновы препараты крапивы повышают сократительную способность гладкой мускулатуры матки.

В корне крапивы содержатся стероиды (в т.ч. бета-ситостерол, стигмастерол, кампестерол, стигмаст-4-ен-3-он), лецитины, полисахариды (глюканы, глюкогогалактуронаны, кислые водорастворимые арабиногалактаны с иммуностимулирующим эффектом), гидроксикумарины (скополетин), лигнаны, керамиды. Показано, что корень крапивы способствует увеличению объема мочи, увеличивает максимальный ток мочи и уменьшает количество остаточной мочи.

Показания к применению:

В составе комбинированной терапии: инфекции мочевого тракта, мочекаменная болезнь, ревматизм, кровотечения, атеросклероз, железодефицитная анемия, симптоматическое лечение при увеличении предстательной железы.

Относится к болезням:

- [Атеросклероз](#)

Крапивы листья (порошок)

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

- [Железодефицитная анемия](#)
- [Инфекции](#)
- [Мочекаменная болезнь](#)
- [Ревматизм](#)

Противопоказания:

Задержка жидкости в организме вследствие нарушений деятельности сердца или функции почек.

Способ применения и дозы:

Принимают внутрь в виде приготовленного настоя 3 раза/сут.

Побочное действие:

Редко: аллергические реакции.

При применении препаратов корня крапивы редко - слабовыраженные нежелательные явления со стороны ЖКТ.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

При одновременном применении экстракта листьев крапивы и диклофенака возможно усиление действия последнего.

Особые указания и меры предосторожности:

Приготовленный настой хранить в прохладном месте не более 2 сут.

При нарушениях функции почек

Противопоказание: задержка жидкости в организме вследствие нарушения функции почек.

Источник: http://drugs.thead.ru/Krapivy_Listya_poroshok