Кравалеон



Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр Википедия Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

◊ ***Капли для приема внутрь***	**100 мл**
адонизид	30.3 мл
жидкий экстракт боярышника	2.2 мл
настойка валерианы	48.6 мл
жидкий экстракт травы желтушника	17.2 мл
камфора рацемическая	400 мг
натрия бромид	2 г

15 мл - флакон-капельницы темного стекла (1) - пачки картонные.
25 мл - флакон-капельницы темного стекла (1) - пачки картонные.
50 мл - флакон-капельницы темного стекла (1) - пачки картонные.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Препарат обладает седативным, а также спазмолитическим и умеренным кардиотоническим действием.

Показания к применению:

— в качестве успокаивающего средства в комплексной терапии функциональных расстройств сердечно-сосудистой системы, кардиалгии, климактерического синдрома, повышенной нервной возбудимости, нарушений сна.

Относится к болезням:

- Кардиалгия
- Кардит

Противопоказания:

— артериальная гипотензия;

— урежение ЧСС (менее 55 уд./мин);

— беременность;

— период лактации;

— возраст до 18 лет;

— повышенная чувствительность к компонентам препарата.

С *осторожностью:* заболевания печени, алкоголизм, эпилепсия, черепно-мозговые травмы, заболевания головного мозга.

Способ применения и дозы:

Препарат применяется внутрь по 10-20 капель 3-4 раза/сут, за 30 мин до еды. При необходимости можно увеличить дозу до 30 капель. Курс лечения - 20-30 дней. Проведение повторных курсов лечения возможно по согласованию с врачом.

Побочное действие:

Возможны аллергические реакции, сонливость, снижение работоспособности. В редких случаях возможно развитие диспепсических расстройств.

Передозировка:

При длительном применении препарата в дозах, превышающих рекомендуемые, возможно усиление выраженности таких побочных эффектов, как сонливость, снижение работоспособности, диспептические расстройства.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Противопоказан при беременности и в период лактации.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

При одновременном применении препарата Кравалеон с лекарственными средствами, угнетающими деятельность центральной нервной системы (седативные, снотворные средства, транквилизаторы, нейролептики), возможно взаимное усиление эффектов.

Особые указания и меры предосторожности:

В составе препарата содержится не менее 64% этилового спирта. В максимальной суточной дозе препарата (120 капель = 2.35 мл) содержится 1.3 г этанола.

Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами.

При применении препарата возможно снижение концентрации внимания и скорости психомоторных реакций, поэтому его не следует применять при занятии потенциально опасными видами деятельности (управление транспортными средствами, работа с механизмами и т.д.), требующими концентрации внимания и быстроты психических и двигательных реакций. Препарат не предназначен для купирования приступов кардиалгии.

При нарушениях функции печени

С осторожностью: заболевания печени.

Применение в детском возрасте

Противопоказан детям до 18 лет.

Условия хранения:

Препарат хранить в защищенном от света месте при температуре от 15° до 25°С. Хранить в местах, недоступных для детей.

Не использовать по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Срок годности:

2 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Kravaleon