

## Кравалеон



### Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)  
[Госреестр](#) [Википедия](#)  
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)<sup>англ</sup>

### Форма выпуска:

<i>Капли для приема внутрь</i>	<b>100 мл</b>
адонизид	30.3 мл
жидкий экстракт боярышника	2.2 мл
настойка валерианы	48.6 мл
жидкий экстракт травы желтушника	17.2 мл
камфора рацемическая	400 мг
натрия бромид	2 г

15 мл - флакон-капельницы темного стекла (1) - пачки картонные.

25 мл - флакон-капельницы темного стекла (1) - пачки картонные.

50 мл - флакон-капельницы темного стекла (1) - пачки картонные.

### Фармакологические свойства:

#### **Фармакодинамика**

Препарат обладает седативным, а также спазмолитическим и умеренным кардиотоническим действием.

### Показания к применению:

— в качестве успокаивающего средства в комплексной терапии функциональных расстройств сердечно-сосудистой системы, кардиалгии, климактерического синдрома, повышенной нервной возбудимости, нарушений сна.

### Относится к болезням:

- [Кардиалгия](#)
- [Кардит](#)

### Противопоказания:

— артериальная гипотензия;

— урежение ЧСС (менее 55 уд./мин);

## **Кравалеон**

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

---

- беременность;
- период лактации;
- возраст до 18 лет;
- повышенная чувствительность к компонентам препарата.

С *осторожностью*: заболевания печени, алкоголизм, эпилепсия, черепно-мозговые травмы, заболевания головного мозга.

### **Способ применения и дозы:**

Препарат применяется внутрь по 10-20 капель 3-4 раза/сут, за 30 мин до еды. При необходимости можно увеличить дозу до 30 капель. Курс лечения - 20-30 дней. Проведение повторных курсов лечения возможно по согласованию с врачом.

### **Побочное действие:**

Возможны аллергические реакции, сонливость, снижение работоспособности. В редких случаях возможно развитие диспепсических расстройств.

### **Передозировка:**

При длительном применении препарата в дозах, превышающих рекомендуемые, возможно усиление выраженности таких побочных эффектов, как сонливость, снижение работоспособности, диспептические расстройства.

### **Применение при беременности и кормлении грудью:**

Противопоказан при беременности и в период лактации.

### **Взаимодействие с другими лекарственными средствами:**

При одновременном применении препарата Кравалеон с лекарственными средствами, угнетающими деятельность центральной нервной системы (седативные, снотворные средства, транквилизаторы, нейролептики), возможно взаимное усиление эффектов.

### **Особые указания и меры предосторожности:**

В составе препарата содержится не менее 64% этилового спирта. В максимальной суточной дозе препарата (120 капель = 2.35 мл) содержится 1.3 г этанола.

*Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами.*

При применении препарата возможно снижение концентрации внимания и скорости психомоторных реакций, поэтому его не следует применять при занятии потенциально опасными видами деятельности (управление транспортными средствами, работа с механизмами и т.д.), требующими концентрации внимания и быстроты психических и двигательных реакций. Препарат не предназначен для купирования приступов кардиалгии.

#### **При нарушениях функции печени**

С осторожностью: заболевания печени.

#### **Применение в детском возрасте**

Противопоказан детям до 18 лет.

### **Условия хранения:**

---

## **Кравалеон**

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

---

Препарат хранить в защищенном от света месте при температуре от 15° до 25°С. Хранить в местах, недоступных для детей.

Не использовать по истечении срока годности, указанного на упаковке.

### **Срок годности:**

2 года.

### **Условия отпуска в аптеке:**

Без рецепта.

**Источник:** <http://drugs.thead.ru/Kravaleon>