

## [Кром-аллерг](#)



### Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Кромоглициевая кислота](#)

### Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#) [Апрель](#)  
[Госреестр](#)<sup>МНН</sup> [Википедия](#)<sup>МНН</sup>  
[PLC VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)<sup>англ</sup>

### Форма выпуска:

**Капли глазные 2%** в виде прозрачного, бесцветного или слегка желтоватого раствора.

	<b>1 мл</b>
кромогликат натрия	20 мг

*Вспомогательные вещества:* натрия гидрофосфата додекагидрат, натрия дигидрофосфата моногидрат, полисорбат 80, сорбитол, динатрия эдетата дигидрат, бензалкония хлорид, вода очищенная.

10 мл - флакон-капельницы полиэтиленовые (1) - пачки картонные.

### Фармакологические свойства:

#### **Фармакодинамика**

Противоаллергический препарат для местного применения в офтальмологии. Стабилизирует мембраны тучных клеток и предотвращает высвобождение гистамина, лейкотриенов и других биологически активных веществ. Задержка высвобождения медиаторов происходит в результате блокирования поступления ионов кальция в клетки.

#### **Фармакокинетика**

Абсорбция через слизистую оболочку глаза незначительна. Системная биодоступность - менее 0.03%. T<sub>1/2</sub> - 5-10 мин.

### Показания к применению:

— лечение (в составе комплексной терапии) и профилактика аллергических конъюнктивитов (острых и хронических);

— для облегчения и снятия раздражений слизистой оболочки глаз, связанных с аллергическими реакциями на факторы окружающей среды и средства бытовой химии, профессиональные вредности (в т.ч. дым, запыленность, пары растворителей и других химических веществ), действие косметических средств и лекарственных препаратов, растения и домашних животных.

### Относится к болезням:

- [Аллергия](#)
- [Астения](#)
- [Конъюнктивит](#)

### Противопоказания:

— детский возраст до 4 лет;

— повышенная чувствительность к компонентам препарата.

### Способ применения и дозы:

При *лечении* **взрослым и детям** закапывают по 1-2 капли 4 раза/сут (максимально до 6 раз) в нижний конъюнктивальный мешок пораженного глаза, через равные интервалы времени. Длительность применения 7 дней при аллергическом сезонном конъюнктивите и до 4-х недель при хроническом аллергическом конъюнктивите.

Для *профилактики* **взрослым и детям** закапывают по 1 капле 4 раза/сут в нижний конъюнктивальный мешок глаза, через равные интервалы времени. Применение начинают за 7-10 дней до возможного развития сезонного аллергического конъюнктивита и продолжают еще в течение 7-10 дней после исчезновения симптомов заболевания.

### Побочное действие:

*Местные реакции:* временное нарушение четкости зрительного восприятия, ощущение жжения в глазу, поверхностное поражение эпителия роговицы (в каплях содержится консервант - бензалкония хлорид).

*Аллергические реакции:* зуд, легкая болезненность и гиперемия конъюнктивы.

*Прочие реакции:* в единичных случаях - тошнота.

### Передозировка:

Данные по передозировке препарата отсутствуют.

### Применение при беременности и кормлении грудью:

Применение при беременности и в период лактации возможно в случае, если предполагаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода и ребенка. Активное вещество препарата может выделяться с грудным молоком, однако неблагоприятное воздействие на ребенка маловероятно из-за незначительной системной абсорбции. Применение в период лактации возможно в случае, если предполагаемая польза для матери превышает потенциальный риск для ребенка.

В *исследованиях на животных* при парентеральном введении в высоких дозах наблюдалось снижение веса плода.

### Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Кромоглициевая кислота может снижать потребность в применении офтальмологических препаратов, содержащих ГКС.

## **Особые указания и меры предосторожности:**

Глазные капли Кром-аллерг содержат консервант бензалкония хлорид, поэтому лицам, носящим контактные линзы, следует удалить их перед применением капель и установить снова не ранее, чем через 15 мин.

*Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами*

В период лечения препаратом Кром-аллерг необходимо соблюдать осторожность при вождении автотранспорта и занятии другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

### **Применение в детском возрасте**

Применение возможно согласно режиму дозирования.

## **Условия хранения:**

Препарат следует хранить в сухом, защищенном от света, недоступном для детей месте, при температуре не выше 25°C.

После вскрытия флакона капли следует использовать в течение 4 недель.

## **Срок годности:**

4 года.

## **Условия отпуска в аптеке:**

По рецепту.

**Источник:** <http://drugs.thead.ru/Krom-allerg>