Крушины кора



Международное непатентованное название (Действующее вещество):

• Крушины ольховидной кора

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель Госреестр $^{\mathrm{MHH}}$ Википедия $^{\mathrm{MHH}}$ РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com $^{\mathrm{ahr}}$

Форма выпуска:

🕽 Сырье растительное - порошок	1 фильтр-пакет
кора крушины	2 г
(0.0)	•

фильтр-пакеты (20) - пачки картонные.

Фармакотерапевтическая группа:

• Органотропные средства

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Оказывает слабительное действие, обусловленное наличием антрагликозидов, вызывающих раздражение рецепторов слизистой оболочки толстого кишечника. Слабительный эффект наступает через 8-12 ч после приема препарата.

Показания к применению:

Хронический запор.

Противопоказания:

Повышенная чувствительность к препарату, запоры неврогенного и эндокринного происхождения, спастические запоры, кишечная непроходимость, синдром острого живота, аппендицит, энтерит, колит, метроррагия, острые лихорадочные состояния. Беременность, период грудного вскармливания, детский возраст до 12 лет.

Способ применения и дозы:

3 фильтр-пакета $(6.0\ \Gamma)$ помещают в стеклянную или эмалированную посуду, заливают $100\ \text{мл}$ $(1/2\ \text{стаканa})$ кипятка, закрывают и настаивают в течение $15\ \text{мин}$, периодически надавливая на пакетики ложкой, затем их отжимают. Объем полученного настоя доводят кипяченой водой до $100\ \text{мл}$.

Принимают внутрь в теплом виде взрослые и дети старше 12 лет по 112 стакана на ночь и утром. Курс лечения 2-3 недели.

Перед применением настой рекомендуется взбалтывать.

Побочное действие:

Возможны аллергические реакции (кожная сыпь), ощущение дискомфорта в животе (метеоризм, спастические боли, тошнота).

Передозировка:

Коликообразные боли в животе, тенезмы, тошнота, рвота, диарея.

Лечение: симптоматическое.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Противопоказан при беременности и в период грудного вскармливания.

Особые указания и меры предосторожности:

При длительном применении препаратов крушины может развиться привыкание и ослабление или отсутствие слабительного эффекта, поэтому целесообразно чередовать их с другими слабительными средствами. Возможно окрашивание мочи в желтый цвет, не требующее отмены препарата.

Применение в детском возрасте

Противопоказан в детском возрасте до 12 лет.

Условия хранения:

В сухом, защищенном от света месте; приготовленный настой - в прохладном месте не более 2-х сут. Хранить в недоступном для детей месте.

Не применять по истечении срока годности.

Срок годности:

5 лет.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Krushiny_kora