

[Ксантинола никотинат \(раствор\)](#)



Код АТХ:

- [C04AD02](#)

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Ксантинола никотинат](#)

Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)
[Госреестр](#)^{МНН} [Википедия](#)^{МНН}
[PLC VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

Раствор для инъекций 15% бесцветный, прозрачный.

	1 мл	1 амп.
ксантинола никотинат	150 мг	300 мг

Вспомогательные вещества: вода д/и.

2 мл - ампулы (5) - упаковки ячейковые контурные (2) - пачки картонные.

2 мл - ампулы (10) - коробки картонные.

Фармакотерапевтическая группа:

- [Гематотропные средства](#)
- [Метаболики](#)
- [Органотропные средства](#)
- [Органотропные средства](#)
- [Органотропные средства](#)

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Препарат сочетает свойства теofilлина и никотиновой кислоты: вызывает расширение периферических сосудов, улучшает коллатеральное кровообращение, улучшает оксигенацию и питание тканей, усиливает окислительное фосфорилирование и синтез АТФ. Ксантинола никотинат улучшает мозговое кровообращение и уменьшает явления церебральной гипоксии. Препарат также активирует процессы фибринолиза, снижает агрегацию тромбоцитов.

Показания к применению:

Ксантинола никотинат (раствор)

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

- облитерирующий атеросклероз;
- эндартериит сосудов нижних конечностей;
- диабетическая ангиопатия;
- ретинопатии;
- острый тромбоз поверхностных и глубоких вен;
- посттромбофлебитический синдром;
- трофические язвы нижних конечностей:
- пролежни;
- синдром Меньера;
- дерматозы, связанные с расстройством трофики сосудистого характера;
- нарушение мозгового кровообращения.

Относится к болезням:

- [Ангина](#)
- [Ангиопатия](#)
- [Атеросклероз](#)
- [Дерматит](#)
- [Диабетическая ангиопатия](#)
- [Нарушение мозгового кровообращения](#)
- [Пролежни](#)
- [Ретинопатия](#)
- [Тромбоз](#)
- [Тромбофлебит](#)
- [Трофические язвы](#)

Противопоказания:

- острая сердечная недостаточность, в т.ч. острый инфаркт миокарда;
- хроническая сердечная недостаточность IIБ-III степени;
- митральный стеноз;
- артериальная гипотензия;
- острое кровотечение;
- язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки в стадии обострения;
- острая почечная недостаточность;
- глаукома;
- детский возраст;
- беременность I триместр;
- повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата.

Способ применения и дозы:

При *острых нарушениях кровоснабжения тканей* препарат вводят в/м по 0.3 г (2 мл 15% раствора) 1-3 раза/сут. В зависимости от характера заболевания дозу можно постепенно увеличить до 0.6-0.9 г (4-6 мл 15% раствора) 2-3 раза/сут. Длительность лечения составляет 2-3 недели.

При *острых нарушениях периферического и мозгового кровообращения* Ксантинола никотинат вводят в/в капельно со скоростью 40-50 капель/ мин. Для этого 1.5 г (10 мл 15% раствора) препарата разводят в 200-500 мл 5% раствора глюкозы или в 200 мл изотонического раствора натрия хлорида, полученную инфузионную смесь вводят капельно в

течение 1.5-4 ч. Инфузию можно повторять до 4 раз/сут; длительность лечения составляет 5-10 дней.

Побочное действие:

Ксантинола никотинат может вызвать головокружение, снижение АД, общую слабость, ощущение жара, покалывание и покраснение кожи верхней части тела, особенно шеи и головы, тошноту, анорексию, диарею. Эти симптомы обычно исчезают через 10-20 мин, не требуют специального лечения и прекращения терапии данным препаратом. При появлении нежелательных эффектов, не описанных в данной инструкции, и усилении вышеуказанных побочных эффектов при терапии данным препаратом следует немедленно сообщить об этом лечащему врачу.

При длительном назначении высоких доз препарат вызывает изменение толерантности к глюкозе, повышение активности печеночных трансаминаз, щелочной фосфатазы, гиперурикемию.

Передозировка:

Препарат малотоксичен.

Симптомы: острая передозировка ксантинола никотината сопровождается артериальной гипотензией, общей слабостью, головокружением, тахикардией, болями в животе и рвотой.

Лечение: при появлении симптомов передозировки назначается симптоматическая терапия.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Противопоказан в I триместре. Во II и III триместрах беременности и в период лактации применение препарата допустимо только при наличии абсолютных показаний и тщательном наблюдении врача.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Во избежание резкого понижения АД препарат нельзя применять одновременно с гипотензивными средствами. Нельзя сочетать с терапией ингибиторами MAO, строфантинном.

Особые указания и меры предосторожности:

Ксантинола никотинат вызывает никотиноподобный синдром, сопровождающийся гиперестезией слизистой оболочки носа и рта (обостряет чувствительность обонятельных и вкусовых рецепторов) в связи с этим запах и вкус принимаемых во время терапии алкогольных напитков воспринимается более резким и извращенным.

Избегать попадания раствора в глаза или на слизистые оболочки.

Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами

Большие дозы препарата могут вызывать головокружение, слабость и артериальную гипотензию, в связи с этим следует воздержаться от управления автотранспортным средством и работы с механизмами.

При нарушениях функции почек

Противопоказан при острой почечной недостаточности.

Применение в детском возрасте

Противопоказан.

Условия хранения:

Список Б. Хранить в защищенном от света и недоступном для детей месте при температуре не выше 25°C.

Ксантинола никотинат (раствор)

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

Срок годности:

3 года.

Условия отпуска в аптеке:

По рецепту.

Источник: http://drugs.thead.ru/Ksantinola_nikotinat_rastvor