

Ксилен Нео



Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)

[Госреестр](#) [Википедия](#)

[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

Форма выпуска, описание и состав

◇ **Спрей назальный с ароматом камфоры и ментола** в виде непрозрачной, белой, гелеобразной или жидкой массы с очень слабым запахом камфоры и ментола и тиксотропными свойствами (густеет в состоянии покоя и разжижается при встряхивании), которая находится во флаконе, укупоренном насосом-дозатором, укомплектованным насадкой-распылителем с защитным колпачком; препарат выдается из флакона через насадку-распылитель в виде аэрозольного облака, представляющего собой диспергированные в газовой среде частицы вязкой жидкости.

	100 г
ксилометазолина гидрохлорид	0.1 г

Вспомогательные вещества: бензиловый спирт - 0.25 г, бензалкония хлорид - 0.01 г, динатрия эдетата дигидрат (Трилон Б) - 0.015 г, камфора рацемическая - 0.005 г, левоментол - 0.008 г, повидон K17 - 0.25 г, целлюлоза микрокристаллическая - 4 г, кармеллоза натрия - 4 г, макрогол 400 - 21.5 г, натрия дигидрофосфата дигидрат - 0.75 г, динатрия гидрофосфата додекагидрат - 0.15 г, вода очищенная - до 100 г.

10 г - флаконы стеклянные (1) - пачки картонные.

15 г - флаконы стеклянные (1) - пачки картонные.

20 г - флаконы стеклянные (1) - пачки картонные.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Сосудосуживающее средство для местного применения в ЛОР-практике. Альфа-адреномиметик. При нанесении на слизистые оболочки вызывает сужение сосудов, в результате этого уменьшается местная гиперемия и отек. При ринитах облегчает носовое дыхание.

Фармакокинетика

При местном применении практически не абсорбируется, концентрации в плазме настолько малы, что их невозможно определить современными аналитическими методами.

Показания к применению:

Острый аллергический ринит, синусит, поллиноз, средний отит (для уменьшения отека слизистой носоглотки), подготовка пациента к диагностическим процедурам в носовых ходах.

Относится к болезням:

- [Аллергический ринит](#)
- [Аллергия](#)
- [Отит](#)
- [Поллиноз](#)
- [Ринит](#)
- [Синусит](#)

Противопоказания:

Закрытоугольная глаукома, атрофический ринит, артериальная гипертензия, тахикардия, выраженный атеросклероз, гипертиреоз, хирургические вмешательства на мозговых оболочках (в анамнезе), повышенная чувствительность к ксилометазолину.

Способ применения и дозы:

Применяют местно в течение 7-14 дней. Доза зависит от используемой лекарственной формы и возраста пациента.

Побочное действие:

При частом и/или длительном применении: раздражение слизистой, жжение, покалывание, чиханье, сухость слизистых носа, гиперсекреция.

Редко: отек слизистой оболочки носа (чаще при длительном применении), сердцебиение, нарушения сердечного ритма, повышение АД, головная боль, рвота, расстройства сна, нарушения зрения.

При длительном применении в высоких дозах: депрессивное состояние.

Применение при беременности и кормлении грудью:

При беременности и в период лактации следует применять только после тщательной оценки соотношения риска и пользы для матери и плода, не допускается превышения рекомендуемых доз.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Несовместим с ингибиторами MAO и трициклическими антидепрессантами.

Особые указания и меры предосторожности:

Диагнозы

- Анафилактический шок
- Отек Квинке
- Сенная лихорадка

Источник: http://drugs.thead.ru/Ksilen_Neo