Ксилометазолин (капли)



Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- Ксилометазолин

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр[МНН] Википедия[МНН] Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

◊ ***Капли назальные 0.05%*** в виде прозрачного, бесцветного или со слегка желтоватым оттенком раствора.

	1 мл
ксилометазолина гидрохлорид	500 мкг

Вспомогательные вещества: бензалкония хлорид 0.15 мг/мл, динатрия эдетат 0.5 мл/1 мл, калия дигидрофосфат 3.63 мг/мл, натрия гидрофосфат 7.13 мг/мл, натрия хлорид 9 мг/мл, вода очищенная до 1 мл.

10 мл - флаконы полимерные (1) - пачки картонные.
15 мл - флаконы полимерные (1) - пачки картонные.
25 мл - флаконы полимерные (1) - пачки картонные.
10 мл - флаконы полимерные с дозатором (1) - пачки картонные.
15 мл - флаконы полимерные с дозатором (1) - пачки картонные.
25 мл - флаконы полимерные с дозатором (1) - пачки картонные.

◊ ***Капли назальные 0.1%*** в виде прозрачного, бесцветного или со слегка желтоватым оттенком раствора.

	1 мл
ксилометазолина гидрохлорид	1 мг

Вспомогательные вещества: бензалкония хлорид 0.15 мг/мл, динатрия эдетат 0.5 мл/мл, калия дигидрофосфат 3.63 мг/мл, натрия гидрофосфат 7.13 мг/мл, натрия хлорид 9 мг/мл, вода очищенная до 1 мл.

10 мл - флаконы полимерные (1) - пачки картонные.
15 мл - флаконы полимерные (1) - пачки картонные.
25 мл - флаконы полимерные (1) - пачки картонные.
10 мл - флаконы полимерные с дозатором (1) - пачки картонные.
15 мл - флаконы полимерные с дозатором (1) - пачки картонные.
25 мл - флаконы полимерные с дозатором (1) - пачки картонные.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Альфа-адреностимулятор, суживает кровеносные сосуды слизистой оболочки полости носа, устраняя отек и гиперемию слизистой оболочки. Облегчает носовое дыхание при ринитах.

Действие наступает через несколько минут и продолжается в течение нескольких часов.

Фармакокинетика

При местном применении практически не абсорбируется, концентрации в плазме настолько малы, что их невозможно определить современными аналитическими методами.

Показания к применению:

Острый аллергический ринит, ОРЗ с явлениями ринита, синусит, поллиноз; средний отит (для уменьшения отека слизистой оболочки носоглотки).

Подготовка больного к диагностическим манипуляциям в носовых ходах.

Относится к болезням:

- Аллергический ринит
- Аллергия
- Отит
- Поллиноз
- Ринит
- Синусит

Противопоказания:

Гиперчувствительность, артериальная гипертензия, тахикардия, выраженный атеросклероз, глаукома, атрофический ринит, тиреотоксикоз, хирургические вмешательства на мозговых оболочках (в анамнезе), детский возраст (до 6 лет - для 0.1% раствора).

С осторожностью. ИБС (стенокардия), гиперплазия предстательной железы, сахарный диабет, беременность, период лактации, детский возраст (для 0.05% раствора - до 2 лет).

Способ применения и дозы:

Интраназально.

Капли для носа для **взрослых и детей старше 6 лет** - по 2-3 капли 0.1% раствора в каждый носовой ход, обычно достаточно 4 раз в день; для **грудных детей и детей в возрасте до 6 лет** - по 1-2 капли 0.05% раствора в каждый носовой ход 1 или 2 раза в день; не следует применять более 3 раз в день.

Побочное действие:

При частом и/или длительном применении - раздражение и/или сухость слизистой оболочки носоглодки, жжение, парестезии, чиханье, гиперсекреция. Редко - отек слизистой оболочки полости носа, сердцебиение, тахикардия, аритмии, повышение АД, головная боль, рвота, бессонница, нарушение зрения; депрессия (при длительном применении в высоких дозах).

Передозировка:

Симптомы: усиление побочных эффектов.

Применение при беременности и кормлении грудью:

С осторожностью: беременность, период лактации.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Несовместим с ингибиторами МАО и трициклическими антидепрессантами.

Особые указания и меры предосторожности:

Перед применением необходимо очистить носовые ходы.

Детям до 2 лет общепринятые клинические дозы не разработаны (использовать только 0.05% раствор).

Не следует применять в течение длительного времени, например, при хроническом рините.

При «простудных» заболеваниях в тех случаях, когда в носу образуются корки, предпочтительно назначать в виде геля.

Пропущенная доза: в течение 1 ч использовать сразу, позже 1 ч не использовать; дозу не удваивать.

Применение в детском возрасте

Противопоказание: детский возраст до 6 лет - для применения 0.1% раствора (у детей можно применять только 0.05% раствор).

С осторожностью: детский возраст до 2-х лет для 0.05% раствора.

Условия хранения:

В сухом, защищенном от света месте при температуре не выше 25°С. Недоступном для детей месте.

Не использовать позже срока, указанного на упаковке.

Срок годности:

3 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Ksilometazolin_kapli