

Ксимедон



Код АТХ:

- [V03A](#)

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Гидроксиэтилдиметилдигидропиримидин](#)

Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#) [Апрель](#)
[Госреестр](#)^{МНН} [Википедия](#)^{МНН}
[РЛС](#) [VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

Таблетки	1 таб.
Гидроксиэтилдиметилдигидропиримидин	250 мг

10 шт. - упаковки ячейковые контурные (5) - пачки картонные.

50 шт. - банки (1) - пачки картонные.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Ксимедон ускоряет процессы регенерации тканей и сокращает сроки заживления ожоговой поверхности, улучшает приживление кожных трансплантатов при аутодермопластике. Способствует нормализации соотношения между содержанием фибриногена в крови и ее фибринолитической активностью, улучшает регионарное кровообращение. Нормализует иммунную систему, повышает фагоцитарную активность Т-лимфоцитов и неспецифическую резистентность организма.

Фармакокинетика

При пероральном приеме ксимедона происходит быстрое всасывание его в течение 0.5-1 ч; C_{max} препарата в сыворотке крови достигается через 1.7 ч. $T_{1/2}$ препарата составляет 5.5 ч. В результате низкого процента связывания с сывороточным альбумином (9 %) и отсутствием биотрансформации в организме, препарат не оказывает конкурентного действия при приеме других лекарственных средств.

Показания к применению:

- глубокие и поверхностные ожоги (подготовка больных к аутодермопластике);
- инфицированные раны;

— трофические язвы.

Относится к болезням:

- [Ожоги](#)
- [Раны](#)

Противопоказания:

— лейкоз (острый и хронический);

— эритремия;

— гиперчувствительность.

Способ применения и дозы:

Внутрь, перед едой по 0.5 г 3-4 раза в день. Курс лечения составляет от 1 до 5 недель.

Побочное действие:

Возможны - диспепсия, аллергические реакции.

Передозировка:

В связи с малой токсичностью и большой широтой терапевтического действия ксимедона случаев токсических проявлений не наблюдалось.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Несовместимость ксимедона с какими-либо лекарственными препаратами не выявлена.

Условия хранения:

Список Б. В сухом, защищенном от света, недоступном для детей месте, при температуре не выше 25°C.

Срок годности:

2 года.

Условия отпуска в аптеке:

По рецепту.

Источник: <http://drugs.thead.ru/Ksimedon>