# Ксимелин Эко



## Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- Ксилометазолин

## Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр[МНН] Википедия[МНН] Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

## Форма выпуска:

◊ ***Спрей назальный 0.05%*** в виде прозрачной, бесцветной до слегка окрашенной жидкости.

| | **1 мл** |
|---|---|
| ксилометазолина гидрохлорид | 500 мкг |

*Вспомогательные вещества:* натрия гидрофосфата дигидрат, натрия дигидрофосфата дигидрат, динатрия эдетат, натрия хлорид, вода очищенная.

10 мл - флаконы пластиковые с дозирующим устройством (1) - пачки картонные.

◊ ***Спрей назальный 0.1%*** в виде прозрачной, бесцветной до слегка окрашенной жидкости.

| | **1 мл** |
|---|---|
| ксилометазолина гидрохлорид | 1 мг |

*Вспомогательные вещества:* натрия гидрофосфата дигидрат, натрия дигидрофосфата дигидрат, динатрия эдетат, натрия хлорид, вода очищенная.

10 мл - флаконы пластиковые с дозирующим устройством (1) - пачки картонные.

## Фармакологические свойства:

***Фармакодинамика***

Ксилометазолин относится к группе местных сосудосуживающих средств (деконгестантов) с альфа-адреномиметическим действием, вызывает сужение кровеносных сосудов слизистой носа, устраняя, таким образом, отек и гиперемию слизистой оболочки носоглотки. Облегчает носовое дыхание при ринитах.

Ксимелин Эко не содержит консервантов. В терапевтических концентрациях не раздражает слизистую, не вызывает гиперемию. Действие наступает через несколько минут и продолжается в течение 10-12 ч.

***Фармакокинетика***

При местном применении практически не абсорбируется, концентрации в плазме настолько малы, что их невозможно определить современными аналитическими методами.

## Показания к применению:

— острые респираторные заболевания с явлениями ринита (насморка);

— острый аллергический ринит;

— поллиноз;

— синусит;

— евстахиит;

— средний отит (для уменьшения отека слизистой носоглотки);

— подготовка больного к диагностическим манипуляциям в носовых ходах.

## Относится к болезням:

- Аллергический ринит
- Аллергия
- Евстахиит
- Насморк
- Острые респираторные заболевания
- Отит
- Поллиноз
- Ринит
- Синусит

## Противопоказания:

— повышенная чувствительность к компонентам препарата;

— артериальная гипертензия;

— тахикардия;

— выраженный атеросклероз;

— глаукома;

— атрофический ринит;

— тиреотоксикоз;

— хирургические вмешательства на мозговых оболочках (в анамнезе);

— беременность;

— детский возраст до 2 лет (для Ксимелина Эко 0.05 %); детский возраст до10 лет (для Ксимелина Эко 0.1 %).

*С осторожностью:* сахарный диабет, стенокардия III- IV функционального класса, гиперплазия предстательной железы.

*Во время лактации* препарат должен применяться только после тщательной оценки соотношения пользы и риска для матери и ребенка, не допускается превышать рекомендуемую дозировку.

## Способ применения и дозы:

Интраназально.

*Ксимелин Эко 0.05 % - спрей для детей от 2 до 10 лет:* по 1 впрыскиванию в каждый носовой ход; не следует применять более 3 раз в день.

*Ксимелин Эко 0.1 % - спрей для взрослых и детей старше 10 лет:* по 1 впрыскиванию в каждый носовой ход (при необходимости можно повторить); не следует применять более 3 раз в день.

Препарат применяется не более 10 дней.

*(одно впрыскивание Ксимелин Эко 0.05 % содержит около 35 мкг ксилометазолина гидрохлорида;*

*одно впрыскивание Ксимелин Эко 0.1 % содержит около 140 мкг ксилометазолина гидрохлорида).*

## Побочное действие:

При частом и/или длительном применении - раздражение и/или сухость слизистой оболочки носоглотки, жжение, покалывание, чихание, гиперсекреция.

Редко - отек слизистой оболочки носа, сердцебиение, тахикардия, аритмия, повышение АД, головная боль, рвота, бессонница, нарушение зрения; депрессия (при длительном применении высоких доз).

## Передозировка:

*Симптомы:* усиление побочных эффектов.

*Лечение:* симптоматическое.

## Применение при беременности и кормлении грудью:

Запрещено принимать данный препарат во время беременности.

*Во время лактации* препарат должен применяться только после тщательной оценки соотношения пользы и риска для матери и ребенка, не допускается превышать рекомендуемую дозировку.

## Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Несовместим с ингибиторами моноаминооксидазы и трициклическими антидепрессантами.

## Особые указания и меры предосторожности:

Не следует применять в течение длительного времени, например, при хроническом рините.

***Применение в детском возрасте***

Запрещено использовать препарат:

детский возраст до 2 лет (для Ксимелина Эко 0.05 %);

детский возраст до10 лет (для Ксимелина Эко 0.1 %).

## Условия хранения:

Препарат следует хранить при температуре не выше 30°С. Хранить в недоступном для детей месте.

**Срок годности -** 3 года.

Не применять по истечении срока годности.

## Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

**Источник:** http://drugs.thead.ru/Ksimelin_Eko