

## [Ксимелин \(спрей\)](#)



### Код АТХ:

- [R01AA07](#)

### Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Ксилометазолин](#)

### Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)  
[Госреестр](#)<sup>МНН</sup> [Википедия](#)<sup>МНН</sup>  
[PLC VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)<sup>англ</sup>

### Форма выпуска:

◇ **Спрей назальный 0.05%** в виде бесцветной, прозрачной жидкости.

	<b>1 мл</b>
ксилометазолина гидрохлорид	500 мкг

*Вспомогательные вещества:* динатрия эдетат - 0.5 мг, натрия гидрофосфата дигидрат - 2 мг, натрия дигидрофосфата дигидрат - 2 мг, натрия хлорид - 7.4 мг, бензалкония хлорид в виде 10% раствора бензалкония - 0.1 мг, вода очищенная - 991.5 мг.

10 мл - флаконы темного стекла с распылителем (1) - пачки картонные.

15 мл - флаконы темного стекла с распылителем (1) - пачки картонные.

◇ **Спрей назальный 0.1%** в виде бесцветной, прозрачной жидкости.

	<b>1 мл</b>
ксилометазолина гидрохлорид	1 мг

*Вспомогательные вещества:* динатрия эдетат - 0.5 мг, натрия гидрофосфата дигидрат - 2 мг, натрия дигидрофосфата дигидрат - 2 мг, натрия хлорид - 7.3 мг, бензалкония хлорид в виде 10% раствора бензалкония - 0.1 мг, вода очищенная - 991.1 мг.

10 мл - флаконы темного стекла с распылителем (1) - пачки картонные.

15 мл - флаконы темного стекла с распылителем (1) - пачки картонные.

### Фармакотерапевтическая группа:

- [Вегетотропные средства](#)
- [Органотропные средства](#)

### Фармакологические свойства:

#### Фармакодинамика

## Ксимелин (спрей)

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

---

Сосудосуживающий препарат для местного применения в ЛОР-практике. Ксилометазолин обладает альфа-адреномиметическим действием. Вызывает сужение кровеносных сосудов слизистой оболочки носа, устраняя таким образом отек и гиперемия слизистой оболочки носоглотки. Облегчает носовое дыхание при ринитах.

В терапевтических концентрациях не раздражает слизистую, не вызывает гиперемия.

Действие наступает через несколько минут после применения и продолжается в течение 10-12 ч.

### Фармакокинетика

При местном применении практически не абсорбируется. Концентрации в плазме настолько малы, что их невозможно определить современными аналитическими методами.

### Показания к применению:

- острые респираторные заболевания с явлениями ринита;
- острый аллергический ринит;
- поллиноз;
- синусит;
- евстахиит;
- средний отит (для уменьшения отека слизистой оболочки носоглотки);
- подготовка больного к диагностическим манипуляциям в носовых ходах.

### Относится к болезням:

- [Аллергический ринит](#)
- [Аллергия](#)
- [Евстахиит](#)
- [Острые респираторные заболевания](#)
- [Отит](#)
- [Поллиноз](#)
- [Ринит](#)
- [Синусит](#)

### Противопоказания:

- артериальная гипертензия;
- тахикардия;
- выраженный атеросклероз;
- глаукома;
- атрофический ринит;
- гипертиреоз;
- хирургические вмешательства на мозговых оболочках (в анамнезе);
- беременность;
- детский возраст до 2 лет (для препарата Ксимелин 0.05%);
- детский возраст до 6 лет (для препарата Ксимелин 0.1%);
- повышенная чувствительность к компонентам препарата.

С *осторожностью* следует применять препарат при сахарном диабете, стенокардии III-IV функционального класса, гиперплазии предстательной железы.

## **Способ применения и дозы:**

**Спрей назальный 0.05%** назначают **детям в возрасте от 2 до 6 лет** по 1 впрыскиванию в каждую ноздрю 1-2 раза/сут.

1 впрыскивание Ксимелина 0.05% содержит около 35 мкг ксилометазолина гидрохлорида.

**Спрей назальный 0.1%** назначают **взрослым и детям старше 6 лет** по 1 впрыскиванию в каждую ноздрю (при необходимости можно повторить впрыскивание).

1 впрыскивание Ксимелина 0.1% содержит около 140 мкг ксилометазолина гидрохлорида.

Препарат следует применять не более 3 раз/сут и в течение не более 7 дней. При необходимости более длительного применения необходима консультация врача.

## **Побочное действие:**

*Местные реакции:* при частом и/или длительном применении – раздражение и/или сухость слизистой оболочки носоглотки, жжение, парестезии, чиханье, гиперсекреция; редко – отек слизистой оболочки носа.

*Системные реакции:* редко – ощущение сердцебиения, тахикардия, аритмии, повышение АД, головная боль, рвота, бессонница, нарушение зрения; при длительном применении в высоких дозах – депрессия.

## **Передозировка:**

*Симптомы:* повышение АД, переходящее в снижение АД, брадикардия, снижение температуры тела.

*Лечение:* проведение симптоматической терапии.

## **Применение при беременности и кормлении грудью:**

Применение препарата при беременности противопоказано.

В период лактации Ксимелин следует применять только после тщательной оценки соотношения пользы для матери и риска для грудного ребенка, не допускается превышения рекомендуемой дозы.

## **Взаимодействие с другими лекарственными средствами:**

При совместном применении с ингибиторами MAO и трициклическими антидепрессантами возможно повышение АД.

## **Особые указания и меры предосторожности:**

Не следует самостоятельно превышать рекомендованные дозы и применять препарат более 7 дней.

*Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами*

Препарат в рекомендуемых дозах не влияет на способность управлять транспортными средствами.

### **Применение в детском возрасте**

Препарат противопоказан до 2 лет (для спрея назального).

Капли назальные 0.05% назначают **детям в возрасте от 2 до 6 лет** по 1-2 капли в каждую ноздрю 1-2 раза/сут.

Капли назальные 0.1% назначают **детям старше 6 лет** по 2-3 капли в каждую ноздрю (при необходимости можно повторить закапывание).

Спрей назальный 0.05% назначают **детям в возрасте от 2 до 6 лет** по 1 впрыскиванию в каждую ноздрю 1-2 раза/сут.

Спрей назальный 0.1% назначают **детям старше 6 лет** по 1 впрыскиванию в каждую ноздрю (при необходимости можно повторить впрыскивание) .

**Условия хранения:**

Препарат следует хранить в недоступном для детей месте при температуре не выше 25°C. Срок годности – 2 года.

**Условия отпуска в аптеке:**

Без рецепта.

**Источник:** [http://drugs.thead.ru/Ksimelin\\_sprey](http://drugs.thead.ru/Ksimelin_sprey)