

[Кука](#)



Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#) [Апрель](#)
[Госреестр](#) [Википедия](#)
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

<i>Сироп</i>	10 мл
сухой экстракт листьев адхатоды сосудистой	400 мг
сухой экстракт корней и корневищ альпинии галанга	400 мг
сухой экстракт листьев базилика священного	50 мг
сухой экстракт листьев мяты полевой	2 мг
сухой экстракт плодов перца длинного	200 мг
сухой экстракт корней солодки голой	400 мг

100 мл - флаконы темного стекла (1) - пачки картонные.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Комбинированный препарат растительного происхождения, оказывает отхаркивающее, противовоспалительное и муколитическое действие.

Показания к применению:

— у взрослых в качестве средства симптоматической терапии при заболеваниях дыхательных путей, сопровождающихся кашлем с трудноотделяемой мокротой (ларингит, трахеит, бронхит).

Относится к болезням:

- [Бронхит](#)
- [Ларингит](#)
- [Трахеит](#)

Противопоказания:

- детский возраст (до 18 лет);
- повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Способ применения и дозы:

Внутрь по 1-2 чайных ложки сиропа 3 раза/сут. Курс лечения - 2 недели. Увеличение продолжительности и проведение повторных курсов лечения возможно по рекомендации врача.

Побочное действие:

Возможны аллергические реакции. В этом случае необходимо прекратить прием препарата и обратиться за консультацией к врачу.

Передозировка:

До настоящего времени сведения о передозировке препарата отсутствуют.

Применение при беременности и кормлении грудью:

В связи с отсутствием в настоящее время достаточных исследований препарат не рекомендуется применять в период беременности и грудного вскармливания.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Кука сироп не следует применять одновременно с противокашлевыми препаратами и лекарственными средствами, уменьшающими образование мокроты, т.к. это затрудняет откашливание разжиженной мокроты.

Особые указания и меры предосторожности:

Препарат содержит сахарозу: в 5 мл (1 чайная ложка) содержится 0.2 ХЕ, что следует учитывать пациентам, страдающим сахарным диабетом и лицам, находящимся на гипокалорийной диете. Перед употреблением содержимое флакона следует взбалтывать.

Применение в детском возрасте

Противопоказан детям до 18 лет.

Условия хранения:

Хранить препарат в защищенном от света месте, при температуре не выше 25°C. Хранить в недоступном для детей месте. Не применять по истечении срока годности.

Срок годности:

3 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: <http://drugs.thead.ru/Kuka>