

## Куриозин



### Код АТХ:

- [D10AX](#)

### Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Цинка гиалуронат](#)

### Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#) [Апрель](#)  
[Госреестр](#)<sup>МНН</sup> [Википедия](#)<sup>МНН</sup>  
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)<sup>англ</sup>

### Форма выпуска:

**Раствор для наружного применения** бесцветный или слабо окрашенный, прозрачный, вязкий.

|                  | <b>1 мл</b> | <b>1 фл.</b> |
|------------------|-------------|--------------|
| гиалуронат цинка | 2.05 мг     | 20.5 мг      |

*Вспомогательные вещества:* калия сорбат, сорбитол, вода д/и.

10 мл - флакон-капельницы полиэтиленовые (1) - пачки картонные.

### Фармакологические свойства:

#### Фармакодинамика

Стимулятор репарации тканей. При взаимодействии гиалуроновой кислоты с молекулами воды возникает дисперсионный матрикс, восполняющий недостающую клеточную ткань. Он образует естественный поддерживающий каркас для клеток, участвующих в заживлении раны, повышает активность гранулоцитов и макрофагов, усиливает пролиферацию фибробластов и ангиогенез. По сравнению с гиалуронатом натрия, гиалуронат цинка оказывает бактериостатическое действие в отношении многих бактерий.

#### Фармакокинетика

## Куриозин

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

---

При местном применении практически не всасывается, в плазме определяется незначительное количество препарата.

### Показания к применению:

— в составе комплексной терапии для местного лечения плохо заживающих, инфицированных ран, язв голени, пролежней, свищей, а также для ускорения нормального заживления ран.

### Относится к болезням:

- [Пролежни](#)

### Противопоказания:

- беременность;
- период грудного вскармливания;
- повышенная чувствительность к какому-либо из компонентов препарата.

### Способ применения и дозы:

Наружно. Раствор наносят 1 раз/сут на поврежденные участки кожи в максимальной дозе 1 капля/см<sup>2</sup>.

После предварительного промывания поверхности раны физиологическим раствором или при необходимости 3% раствором перекиси водорода следует нанести несколько капель раствора Куриозин на марлевую салфетку в количестве, необходимом для равномерного увлажнения всей раневой поверхности в максимальной дозе 1 капля/см<sup>2</sup>. Покрыть рану стерильной марлевой салфеткой или бинтом, не липнущим к раневой поверхности. На сильно мокнущие раны раствор можно наносить 2 раза/сут. Длительность терапии индивидуальна и зависит от формы и тяжести заболевания.

### Побочное действие:

В начале лечения возможно ощущение легкого жжения, которое постепенно исчезает.

Очень редко на прилегающих участках кожи возможно проявление аллергических реакций (раздражение и контактный дерматит).

### Передозировка:

Не описана.

### Применение при беременности и кормлении грудью:

Нет данных о применении препарата при беременности и в период грудного вскармливания.

### Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Данные о взаимодействии с другими лекарственными препаратами не предоставлены.

### Особые указания и меры предосторожности:

Не вызывает фотосенсибилизации, не окрашивает кожу и белье.

**При нарушениях функции почек**

## **Куриозин**

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

---

Данные о применении препарата у больных с нарушениями функции почек не предоставлены.

### ***При нарушениях функции печени***

Данные о применении препарата у больных с нарушениями функции печени не предоставлены.

### ***Применение в пожилом возрасте***

Данные о применении препарата пациентам пожилого возраста не предоставлены.

### ***Применение в детском возрасте***

Данные о назначении препарата детям не предоставлены.

## **Условия хранения:**

Препарат следует хранить в недоступном для детей месте при температуре от 15° до 30°С. Не использовать по истечению срока годности, указанного на упаковке.

## **Срок годности:**

2 года.

## **Условия отпуска в аптеке:**

По рецепту.

**Источник:** <http://drugs.thead.ru/Kuriozin>