Куриозин



Код АТХ:

- D10AX

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- Цинка гиалуронат

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр[МНН] Википедия[МНН] Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

Раствор для наружного применения бесцветный или слабо окрашенный, прозрачный, вязкий.

	1 мл	**1 фл.**
гиалуронат цинка	2.05 мг	20.5 мг

Вспомогательные вещества: калия сорбат, сорбитол, вода д/и.

10 мл - флакон-капельницы полиэтиленовые (1) - пачки картонные.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Стимулятор репарации тканей. При взаимодействии гиалуроновой кислоты с молекулами воды возникает дисперсионный матрикс, восполняющий недостающую клеточную ткань. Он образует естественный поддерживающий каркас для клеток, участвующих в заживлении раны, повышает активность гранулоцитов и макрофагов, усиливает пролиферацию фибробластов и ангиогенез. По сравнению с гиалуронатом натрия, гиалуронат цинка оказывает бактериостатическое действие в отношении многих бактерий.

Фармакокинетика

При местном применении практически не всасывается, в плазме определяется незначительное количество препарата.

Показания к применению:

— в составе комплексной терапии для местного лечения плохо заживающих, инфицированных ран, язв голени, пролежней, свищей, а также для ускорения нормального заживления ран.

Относится к болезням:

- Пролежни

Противопоказания:

— беременность;

— период грудного вскармливания;

— повышенная чувствительность к какому-либо из компонентов препарата.

Способ применения и дозы:

Наружно. Раствор наносят 1 раз/сут на поврежденные участки кожи в максимальной дозе 1 капля/см^2.

После предварительного промывания поверхности раны физиологическим раствором или при необходимости 3% раствором перекиси водорода следует нанести несколько капель раствора Куриозин на марлевую салфетку в количестве, необходимом для равномерного увлажнения всей раневой поверхности в максимальной дозе 1 капля/см^2. Покрыть рану стерильной марлевой салфеткой или бинтом, не липнущим к раневой поверхности. На сильно мокнущие раны раствор можно наносить 2 раза/сут. Длительность терапии индивидуальна и зависит от формы и тяжести заболевания.

Побочное действие:

В начале лечения возможно ощущение легкого жжения, которое постепенно исчезает.

Очень редко на прилегающих участках кожи возможно проявление аллергических реакций (раздражение и контактный дерматит).

Передозировка:

Не описана.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Нет данных о применении препарата при беременности и в период грудного вскармливания.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Данные о взаимодействии с другими лекарственными препаратами не предоставлены.

Особые указания и меры предосторожности:

Не вызывает фотосенсибилизации, не окрашивает кожу и белье.

При нарушениях функции почек

Данные о применении препарата у больных с нарушениями функции почек не предоставлены.

При нарушениях функции печени

Данные о применении препарата у больных с нарушениями функции печени не предоставлены.

Применение в пожилом возрасте

Данные о применении препарата пациентам пожилого возраста не предоставлены.

Применение в детском возрасте

Данные о назначении препарата детям не предоставлены.

Условия хранения:

Препарат следует хранить в недоступном для детей месте при температуре от 15° до 30°C. Не использовать по истечения срока годности, указанного на упаковке.

Срок годности:

2 года.

Условия отпуска в аптеке:

По рецепту.

Источник: http://drugs.thead.ru/Kuriozin