

Куриозин (гель)

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

[Куриозин \(гель\)](#)



Код АТХ:

- [D10AX](#)

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Цинка гиалуронат](#)

Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#) [Апрель](#)
[Госреестр](#)^{МНН} [Википедия](#)^{МНН}
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

◇ **Гель для наружного применения** бесцветный или почти бесцветный, прозрачный, практически без запаха.

	1 г	1 туба
гиалуронат цинка	1.03 мг	15.4 мг

Вспомогательные вещества: калия сорбат, натрия гидроксид, карбомер, вода д/и.

15 г - тубы алюминиевые (1) - пачки картонные.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Стимулятор репарации тканей. При взаимодействии гиалуроновой кислоты с молекулами воды возникает дисперсионный матрикс, восполняющий недостающую клеточную ткань и образующий естественный поддерживающий каркас для клеток, участвующих в заживлении раны, повышает активность гранулоцитов и макрофагов, усиливает пролиферацию фибробластов и ангиогенез. По сравнению с гиалуронатом натрия, гиалуронат цинка оказывает бактериостатическое действие в отношении многих бактерий.

Фармакокинетика

Куриозин (гель)

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

При местном применении практически не всасывается, в плазме определяется незначительное количество препарата.

Показания к применению:

— местное лечение всех форм акне легкой и средней степени тяжести, в первую очередь комедонов и папуло-пустулезных угрей.

Относится к болезням:

- [Акне](#)

Противопоказания:

- беременность;
- период грудного вскармливания;
- повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Способ применения и дозы:

Наружно. Гель наносят 2 раза/сут на пораженные участки кожи тонким слоем после предварительного ее очищения. Препарат всасывается в течение нескольких минут и не требует применения повязки. Длительность терапии индивидуальна и зависит от формы и тяжести заболевания.

Побочное действие:

В начале лечения возможно чувство легкого жжения, которое постепенно исчезает, аллергические реакции. Гель может вызвать ощущение стягивания при применении его при сухом типе кожи.

Передозировка:

До настоящего времени о случаях передозировки не сообщалось.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Нет данных о применении препарата при беременности и в период грудного вскармливания.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Данных о взаимодействии с другими лекарственными препаратами нет.

Особые указания и меры предосторожности:

Препарат не вызывает фотосенсибилизации, не окрашивает кожу и белье.

При нарушениях функции почек

Нет данных о применении препарата у пациентов с нарушениями функции почек.

При нарушениях функции печени

Нет данных о применении препарата у пациентов с нарушениями функции печени.

Куриозин (гель)

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

Применение в пожилом возрасте

Данные о применении препарата у лиц пожилого возраста не предоставлены.

Применение в детском возрасте

Данные о применении препарата у детей не предоставлены.

Условия хранения:

Препарат следует хранить в недоступном для детей месте при температуре от 15° до 30°С. Не использовать по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Срок годности:

2 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Kuriozin_gel