Квинакс



Код АТХ:

- S01XA

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- Азапентацен

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр[МНН] Википедия[МНН] Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

Капли глазные в виде пурпурно-красного прозрачного раствора.

	1 мл
натрия азапентацена полисульфонат	150 мкг

Вспомогательные вещества: борная кислота, тиомерсал, метилпарабен, пропилпарабен, вода очищенная.

15 мл - флакон-капельницы пластиковые "Drop Tainer" (1) - пачки картонные.

Фармакотерапевтическая группа:

- Метаболики
- Органотропные средства

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Препарат, применяемый при катаракте. Азапентацен предохраняет сульфгидрильные группы белков хрусталика от окисления и способствует рассасыванию непрозрачных белков хрусталика. Обладает активирующим влиянием на протеолитические ферменты, содержащиеся в водянистой влаге передней камеры глаза.

Фармакокинетика

При местном применении системная абсорбция низкая.

Показания к применению:

Катаракта:

— старческая;

— травматическая;

— врожденная;

— вторичная.

Относится к болезням:

- Травмы

Противопоказания:

— повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Способ применения и дозы:

Препарат закапывают по 1-2 капли в конъюнктивальный мешок пораженного глаза (или глаз) 3-5 раз/сут.

Побочное действие:

При применении по показаниям в рекомендуемых дозах побочное действие не выявлено.

Передозировка:

При случайном приеме внутрь не установлено симптомов передозировки.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Достаточного опыта по применению Квинакса при беременности и в период лактации (грудного вскармливания) нет. Возможно применение Квинакса у беременных женщин и кормящих матерей в случае, когда ожидаемый терапевтический эффект превышает потенциальный риск развития побочных эффектов у плода или грудного ребенка.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Взаимодействие с другими лекарственными средствами в настоящее время не установлено.

Особые указания и меры предосторожности:

Квинакс предназначен для длительной терапии. Не рекомендуется прерывать лечение даже в случае быстрого улучшения.

Пациенты, использующие контактные линзы, должны применять Квинакс только при снятых линзах и могут устанавливать их обратно через 15 мин после закапывания препарата.

После каждого использования препарата необходимо закрывать флакон. Не следует прикасаться кончиком капельницы к глазу.

Использование в педиатрии

Достаточного опыта по применению Квинакса у детей нет. Возможно применение Квинакса у детей в случае, когда ожидаемый терапевтический эффект превышает потенциальный риск развития возможных побочных эффектов.

Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами

Пациентам, у которых после инстилляции временно нарушается четкость зрения, не рекомендуется водить машину или работать со сложной техникой, станками или каким-либо другим сложным оборудованием, требующим четкости зрения, сразу после закапывания препарата.

Применение в детском возрасте

Достаточного опыта по применению Квинакса у детей нет. Возможно применение Квинакса у детей в случае, когда ожидаемый терапевтический эффект превышает потенциальный риск развития возможных побочных эффектов.

Условия хранения:

Список Б. Препарат следует хранить в недоступном для детей месте при температуре от 8° до 24°С. Срок годности – 3 года.

После вскрытия флакона препарат следует использовать в течение 1 месяца.

Условия отпуска в аптеке:

По рецепту.

Источник: http://drugs.thead.ru/Kvinaks