

[Л-Карнитин Ромфарм](#)



Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Левокарнитин](#)

Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#) [Апрель](#)
[Госреестр](#)^{МНН} [Википедия](#)^{МНН}
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

Форма выпуска, описание и состав

Раствор для в/в и в/м введения бесцветный, прозрачный.

	1 мл
левокарнитин	200 мг

Вспомогательные вещества: хлористоводородной кислоты раствор 1 М - до pH 6.3-6.5, вода д/и - до 1 мл.

5 мл - ампулы темного стекла (5) - упаковки контурные ячейковые (1) - пачки картонные.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Витамин группы В (витамин В₇), производное аминокислоты, которая является эссенциальным кофактором метаболизма жирных кислот. Нормализует белковый и жировой обмен. Оказывает анаболическое действие. Способствует нормализации основного обмена при гипертиреозе.

Фармакокинетика

При приеме внутрь хорошо абсорбируется. С_{max} достигается через 3 ч, терапевтическая концентрация сохраняется в течение 9 ч. При в/м введении обнаруживается в плазме в течение 4 ч. После в/в введения уже спустя 3 ч исчезает из крови. Легко проникает в печень и миокард, медленнее - в мышцы. Выводится почками преимущественно в виде ацильных эфиров.

Показания к применению:

Микropедиа́трия и педиа́трия: гипотрофия, гипотония, адинамия, последствия родовой травмы и асфиксии, состояния после тяжелых заболеваний и операций. Психиатрия и неврология: неврогенная анорексия, физическое истощение, травматическая энцефалопатия. Гастроэнтерология: хронический гастрит с пониженной секреторной функцией, хронический панкреатит с пониженной внешнесекреторной функцией. Эндокринология: задержка роста у детей до 16 лет, легкие формы тиреотоксикоза. Дерматология: псориаз, себорейная экзема, склеродермия.

Относится к болезням:

- [Гастрит](#)
- [Гастроэнтерит](#)
- [Гипотония](#)
- [Дерматит](#)
- [Неврит](#)
- [Неврозы](#)
- [Панкреатит](#)
- [Псориаз](#)
- [Себорея](#)
- [Склерит](#)
- [Склеродермия](#)
- [Тиреотоксикоз](#)
- [Травмы](#)
- [Экзема](#)
- [Энцефалит](#)

Противопоказания:

Повышенная чувствительность к левокарнитину.

Способ применения и дозы:

Принимают внутрь. Дозы и продолжительность лечения устанавливают индивидуально в зависимости от показаний.

Побочное действие:

Диагнозы

- Болезнь Крона
- Боли в животе
- Диарея
- Дисбактериоз кишечника

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

При одновременном применении анаболики усиливают эффект левокарнитина.

При одновременном применении ГКС способствуют накоплению левокарнитина в тканях (кроме печени).

Особые указания и меры предосторожности:

В настоящее время изучается возможность применения левокарнитина для лечения митохондриальной миопатии, вызванной зидовудином.

Источник: http://drugs.thead.ru/L-Karnitin_Romfarm