Л-Карнитин Ромфарм



Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- Левокарнитин

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр[МНН] Википедия[МНН] Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

Форма выпуска, описание и состав

Раствор для в/в и в/м введения бесцветный, прозрачный.

	1 мл
левокарнитин	200 мг

Вспомогательные вещества: хлористоводородной кислоты раствор 1 М - до pH 6.3-6.5, вода д/и - до 1 мл.

5 мл - ампулы темного стекла (5) - упаковки контурные ячейковые (1) - пачки картонные.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Витамин группы В (витамин B_T), производное аминокислоты, которая является эссенциальным кофактором метаболизма жирных кислот. Нормализует белковый и жировой обмен. Оказывает анаболическое действие. Способствует нормализации основного обмена при гипертиреозе.

Фармакокинетика

При приеме внутрь хорошо абсорбируется. C_{max} достигается через 3 ч, терапевтическая концентрация сохраняется в течение 9 ч. При в/м введении обнаруживается в плазме в течение 4 ч. После в/в введения уже спустя 3 ч исчезает из крови. Легко проникает в печень и миокард, медленнее - в мышцы. Выводится почками преимущественно в виде ацильных эфиров.

Показания к применению:

Микропедиатрия и педиатрия: гипотрофия, гипотония, адинамия, последствия родовой травмы и асфиксии, состояния после тяжелых заболеваний и операций. Психиатрия и неврология: неврогенная анорексия, физическое истощение, травматическая энцефалопатия. Гастроэнтерология: хронический гастрит с пониженной секреторной функцией, хронический панкреатит с пониженной внешнесекреторной функцией. Эндокринология: задержка роста у детей до 16 лет, легкие формы тиреотоксикоза. Дерматология: псориаз, себорейная экзема, склеродермия.

Относится к болезням:

- Гастрит
- Гастроэнтерит
- Гипотония
- Дерматит
- Неврит
- Неврозы
- Панкреатит
- Псориаз
- Себорея
- Склерит
- Склеродермия
- Тиреотоксикоз
- Травмы
- Экзема
- Энцефалит

Противопоказания:

Повышенная чувствительность к левокарнитину.

Способ применения и дозы:

Принимают внутрь. Дозы и продолжительность лечения устанавливают индивидуально в зависимости от показаний.

Побочное действие:

Диагнозы

- Болезнь Крона
- Боли в животе
- Диарея
- Дисбактериоз кишечника

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

При одновременном применении анаболики усиливают эффект левокарнитина.

При одновременном применении ГКС способствуют накоплению левокарнитина в тканях (кроме печени).

Особые указания и меры предосторожности:

В настоящее время изучается возможность применения левокарнитина для лечения митохондриальной миопатии, вызванной зидовудином.

Источник: http://drugs.thead.ru/L-Karnitin_Romfarm