

## Лаксигал



### **Международное непатентованное название (Действующее вещество):**

- [Натрия пикосульфат](#)

### **Полезные ссылки:**

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)  
[Госреестр](#)<sup>МНН</sup> [Википедия](#)<sup>МНН</sup>  
[PLC VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)<sup>англ</sup>

### **Форма выпуска:**

◇ **Капли для приема внутрь** в виде прозрачной жидкости от бесцветного до слабо-желто-коричневого цвета.

	<b>1 мл</b>	<b>1 фл.</b>
Натрия пикосульфат	7.5 мг	75 мг

**Вспомогательные вещества:** раствор сорбитола 70% (некристаллизующийся), этилпарагидроксibenзоат натрия, хлористоводородная кислота 35%, вода очищенная.

10 мл - флакон-капельницы темного стекла (1) - пачки картонные.

25 мл - флакон-капельницы темного стекла (1) - пачки картонные.

### **Фармакотерапевтическая группа:**

- [Органотропные средства](#)

### **Фармакологические свойства:**

#### **Фармакодинамика**

Слабительное средство. Активная форма препарата, образующаяся путем гидролиза под влиянием кишечных микроорганизмов, непосредственно возбуждает нервные структуры кишечной стенки, в результате чего ускоряется продвижение кишечного содержимого, уменьшается всасывание электролитов и воды.

Действие наступает через 10-12 ч после приема.

### **Фармакокинетика**

После приема внутрь не всасывается из ЖКТ и не подвергается печеночно-кишечной циркуляции.

### **Показания к применению:**

- атонический запор;
- регулирование стула (геморрой, проктит, трещины ануса);
- подготовка к хирургическим операциям, инструментальным и рентгенологическим исследованиям.

### **Относится к болезням:**

- [Геморрой](#)
- [Запор](#)
- [Проктит](#)

### **Противопоказания:**

- кишечная непроходимость;
- ущемленная грыжа;
- острые воспалительные заболевания органов брюшной полости;
- перитонит;
- абдоминальные боли (неясного генеза);
- кровотечения из ЖКТ;
- метроррагия;
- цистит;
- тяжелая дегидратация;
- спастический запор;
- детский возраст (до 4 лет);
- беременность (I триместр);
- гиперчувствительность.

*С осторожностью* - период лактации.

### **Способ применения и дозы:**

Внутри в небольшом количестве воды, перед сном.

**Взрослые и дети старше 10 лет** - по 12-24 капли. **Дети в возрасте от 4 до 10 лет** - по 6-12 капель.

В зависимости от полученного эффекта дозу при последующих приемах увеличивают или уменьшают.

### **Побочное действие:**

*Возможно:* диарея, абдоминальные боли, обезвоживание, нарушения водно-электролитного баланса, слабость, судороги, снижение АД.

### **Передозировка:**

## **Лаксигал**

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

---

*Симптомы:* см. раздел «Побочное действие». Кроме того, при хронической передозировке возможно развитие ишемии слизистой оболочки толстой кишки, вторичного гиперальдостеронизма, мочекаменной болезни, поражения почечных канальцев.

*Лечение:* промывание желудка, коррекция нарушений водно-электролитного баланса, спазмолитические средства.

### **Применение при беременности и кормлении грудью:**

При беременности следует применять только по назначению врача. Противопоказание: беременность (I триместр).

С *осторожностью* - период лактации.

### **Взаимодействие с другими лекарственными средствами:**

Возможно повышение чувствительности к сердечным гликозидам.

ГКС, диуретики увеличивают риск развития электролитных нарушений.

Антибиотики широкого спектра действия снижают послабляющий эффект.

### **Особые указания и меры предосторожности:**

Не следует применять ежедневно без врачебного контроля более 10 дней.

Детям следует применять только по назначению врача.

#### ***Применение в детском возрасте***

Противопоказание: детский возраст (до 4 лет). В возрасте от 4 до 10 лет требуется коррекция дозы (см. Режим дозирования).

### **Условия хранения:**

Хранить при температуре от 10°C до 25°C, в защищенном от света и недоступном для детей месте.

### **Срок годности:**

3 года.

### **Условия отпуска в аптеке:**

Без рецепта.

**Источник:** <http://drugs.thead.ru/Laksigal>