Лаксигал



Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- Натрия пикосульфат

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр[МНН] Википедия[МНН] Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

◊ ***Капли для приема внутрь*** в виде прозрачной жидкости от бесцветного до слабо-желто-коричневого цвета.

	1 мл	**1 фл.**
натрия пикосульфат	7.5 мг	75 мг

Вспомогательные вещества: раствор сорбитола 70% (некристаллизующийся), этилпарагидроксибензоат натрия, хлористоводородная кислота 35%, вода очищенная.

10 мл - флакон-капельницы темного стекла (1) - пачки картонные.
25 мл - флакон-капельницы темного стекла (1) - пачки картонные.

Фармакотерапевтическая группа:

- Органотропные средства

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Слабительное средство. Активная форма препарата, образующаяся путем гидролиза под влиянием кишечных микроорганизмов, непосредственно возбуждает нервные структуры кишечной стенки, в результате чего ускоряется продвижение кишечного содержимого, уменьшается всасывание электролитов и воды.

Действие наступает через 10-12 ч после приема.

Фармакокинетика

После приема внутрь не всасывается из ЖКТ и не подвергается печеночно-кишечной циркуляции.

Показания к применению:

— атонический запор;

— регулирование стула (геморрой, проктит, трещины ануса);

— подготовка к хирургическим операциям, инструментальным и рентгенологическим исследованиям.

Относится к болезням:

- Геморрой
- Запор
- Проктит

Противопоказания:

— кишечная непроходимость;

— ущемленная грыжа;

— острые воспалительные заболевания органов брюшной полости;

— перитонит;

— абдоминальные боли (неясного генеза);

— кровотечения из ЖКТ;

— метроррагия;

— цистит;

— тяжелая дегидратация;

— спастический запор;

— детский возраст (до 4 лет);

— беременность (I триместр);

— гиперчувствительность.

С *осторожностью* - период лактации.

Способ применения и дозы:

Внутрь в небольшом количестве воды, перед сном.

Взрослые и дети старше 10 лет - по 12-24 капли. **Дети в возрасте от 4 до 10 лет** - по 6-12 капель.

В зависимости от полученного эффекта дозу при последующих приемах увеличивают или уменьшают.

Побочное действие:

Возможно: диарея, абдоминальные боли, обезвоживание, нарушения водно-электролитного баланса, слабость, судороги, снижение АД.

Передозировка:

Симптомы: см. раздел «Побочное действие». Кроме того, при хронической передозировке возможно развитие ишемии слизистой оболочки толстой кишки, вторичного гиперальдостеронизма, мочекаменной болезни, поражения почечных канальцев.

Лечение: промывание желудка, коррекция нарушений водно-электролитного баланса, спазмолитические средства.

Применение при беременности и кормлении грудью:

При беременности следует применять только по назначению врача. Противопоказание: беременность (I триместр).

С *осторожностью* - период лактации.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Возможно повышение чувствительности к сердечным гликозидам.

ГКС, диуретики увеличивают риск развития электролитных нарушений.

Антибиотики широкого спектра действия снижают послабляющий эффект.

Особые указания и меры предосторожности:

Не следует применять ежедневно без врачебного контроля более 10 дней.

Детям следует применять только но назначению врача.

Применение в детском возрасте

Противопоказание: детский возраст (до 4 лет). В возрасте от 4 до 10 лет требуется коррецкия дозы (см. Режим дозирования).

Условия хранения:

Хранить при температуре от 10°С до 25°С, в защищенном от света и недоступном для детей месте.

Срок годности:

3 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Laksigal