# Лактасол



## Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр Википедия Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

## Фармакологические свойства:

***Фармакодинамика***

Комбинированный препарат, устраняет нарушения водно-электролитного баланса (с коррекцией метаболического ацидоза путем изменения буферной емкости крови). Улучшает реологические свойства крови и периферическое кровообращение (в результате гемодилюции и снижения вязкости крови). Оказывает плазмозамещающее, дезинтоксикационное и диуретическое действие.

## Показания к применению:

Нарушения кровообращения на фоне дегидратации и/или выхода жидкости из сосудистого русла во внеклеточное пространство:

— травма;

— ожоговая болезнь;

— геморрагический, травматический, операционный и послеоперационный шок;

— перитонит;

— кишечная непроходимость;

— диарея различной этиологии;

— метаболический ацидоз.

## Относится к болезням:

- Геморрой
- Диарея
- Перитонит
- Травмы
- Шок

## Противопоказания:

— гиперчувствительность.

## Способ применения и дозы:

*Травматический шок:* в I стадии в/в струйно вводят 2-3 л раствора, при улучшении гемодинамических показателей - в/в капельно. При *тяжелом шоке* применяют в сочетании с кровью, полиглюкином, плазмой, протеином только после выведения больного из состояния гемодинамического криза. Доза устанавливается индивидуально в зависимости от состояния больного, не менее 1-2 л.

*Ожоговая болезнь*: в *I периоде* применение допустимо при ожогах не более 10-15% поверхности тела в дозе до 3 л. При *более обширных термических травмах*, при *дефиците объема плазмы* и *гипотензии* применяют в сочетании с полиглюкином, плазмой, альбумином. Доза при комбинированном лечении в первые сутки - не менее 1-2 л. Во вторые сутки - 1/2 объема, введенного в первые 24 ч. Во *II-III периодах ожоговой болезни* доза зависит от тяжести проявления нарушений и колеблется от 400 до 1000 мл.

При *острых циркуляторных нарушениях на фоне тяжелых гнойно-хирургических осложнений (перитонит, панкреатит, сепсис)* - до 2-4 л в сутки, в течение 3-4 дней (в составе комбинированной теорапии).

При *нарушениях водно-электролитного баланса и/или КОС, кишечной непроходимости, парезе кишечника, язвенном колите, дизентерии, диарее* - 1-3 л/сут.

## Побочное действие:

Нарушения КОС.

## Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Усиливает действие осмотических диуретиков.

**Источник:** http://drugs.thead.ru/Laktasol