

Лактасол



Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#) [Апрель](#)
[Госреестр](#) [Википедия](#)
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Комбинированный препарат, устраняет нарушения водно-электролитного баланса (с коррекцией метаболического ацидоза путем изменения буферной емкости крови). Улучшает реологические свойства крови и периферическое кровообращение (в результате гемодилюции и снижения вязкости крови). Оказывает плазмозамещающее, дезинтоксикационное и диуретическое действие.

Показания к применению:

Нарушения кровообращения на фоне дегидратации и/или выхода жидкости из сосудистого русла во внеклеточное пространство:

- травма;
- ожоговая болезнь;
- геморрагический, травматический, операционный и послеоперационный шок;
- перитонит;
- кишечная непроходимость;
- диарея различной этиологии;
- метаболический ацидоз.

Относится к болезням:

- [Геморрой](#)
- [Диарея](#)
- [Перитонит](#)
- [Травмы](#)
- [Шок](#)

Противопоказания:

— гиперчувствительность.

Способ применения и дозы:

Травматический шок: в I стадии в/в струйно вводят 2-3 л раствора, при улучшении гемодинамических показателей - в/в капельно. При *тяжелом шоке* применяют в сочетании с кровью, полиглюкином, плазмой, протеином только после выведения больного из состояния гемодинамического криза. Доза устанавливается индивидуально в зависимости от состояния больного, не менее 1-2 л.

Ожоговая болезнь: в I периоде применение допустимо при ожогах не более 10-15% поверхности тела в дозе до 3 л. При *более обширных термических травмах*, при *дефиците объема плазмы и гипотензии* применяют в сочетании с полиглюкином, плазмой, альбумином. Доза при комбинированном лечении в первые сутки - не менее 1-2 л. Во вторые сутки - 1/2 объема, введенного в первые 24 ч. Во II-III периодах ожоговой болезни доза зависит от тяжести проявления нарушений и колеблется от 400 до 1000 мл.

При *острых циркуляторных нарушениях на фоне тяжелых гнойно-хирургических осложнений* (перитонит, панкреатит, сепсис) - до 2-4 л в сутки, в течение 3-4 дней (в составе комбинированной терапии).

При *нарушениях водно-электролитного баланса и/или КОС, кишечной непроходимости, парезе кишечника, язвенном колите, дизентерии, диарее* - 1-3 л/сут.

Побочное действие:

Нарушения КОС.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Усиливает действие осмотических диуретиков.

Источник: <http://drugs.thead.ru/Laktasol>