

## Лактофильтрум



### Код АТХ:

- [A07BC](#)

### Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Лактулоза](#)
- [Лигнин гидролизный](#)

### Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#) [Апрель](#)  
[Госреестр](#)<sup>МНН МНН</sup> [Википедия](#)<sup>МНН МНН</sup>  
[PLC VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)<sup>англ</sup>

### Форма выпуска:

◇ **Таблетки** темно-коричневого цвета с бело-серыми вкраплениями, капсуловидные, двояковыпуклые, с риской.

	<b>1 таб.</b>
лигнин гидролизный	355 мг
лактолоза	120 мг

*Вспомогательные вещества:* кроскармеллоза натрия - 20 мг, магния стеарат - 5 мг.

- 10 шт. - упаковки ячейковые контурные (1) - пачки картонные.
- 10 шт. - упаковки ячейковые контурные (2) - пачки картонные.
- 10 шт. - упаковки ячейковые контурные (3) - пачки картонные.
- 10 шт. - упаковки ячейковые контурные (6) - пачки картонные.
- 15 шт. - упаковки ячейковые контурные (2) - пачки картонные.
- 15 шт. - упаковки ячейковые контурные (4) - пачки картонные.
- 30 шт. - флаконы полимерные (1) - пачки картонные.
- 60 шт. - флаконы полимерные (1) - пачки картонные.

### Фармакотерапевтическая группа:

- [Органотропные средства](#)

- [Органотропные средства](#)

## Фармакологические свойства:

### Фармакодинамика

Энтеросорбент. Фармакологическое действие препарата Лактофильтрум обусловлено свойствами входящих в его состав активных компонентов - лигнина и лактулозы.

*Лигнин гидролизный* - энтеросорбент природного происхождения, состоящий из продуктов гидролиза компонентов древесины, обладает высокой сорбирующей активностью и неспецифическим дезинтоксикационным действием. Связывает в кишечнике и выводит из организма патогенные бактерии и бактериальные токсины, лекарственные препараты, соли тяжелых металлов, этанол, аллергены, а также избыток некоторых продуктов обмена веществ, в т.ч. билирубин, холестерин, гистамин, серотонин, мочевины, иные метаболиты, ответственные за развитие эндогенного токсикоза.

*Лактулоза* - синтетический дисахарид, молекула которого состоит из остатков галактозы и фруктозы. В толстой кишке лактулоза в качестве субстрата ферментируется нормальной микрофлорой кишечника, стимулируя рост бифидо- и лактобактерий. В результате гидролиза лактулозы в толстом кишечнике образуются органические кислоты - молочная, уксусная и муравьиная, подавляющие рост патогенных микроорганизмов и уменьшающие вследствие этого продукцию азотсодержащих токсических веществ. Описанный процесс приводит к увеличению осмотического давления в просвете толстого кишечника и стимулированию перистальтики.

Комплексное действие препарата направлено на нормализацию микробиоценоза толстого кишечника и снижение интенсивности эндогенных токсических состояний.

### Фармакокинетика

*Лигнин гидролизный* не всасывается, полностью выводится из кишечника в течение 24 ч.

*Лактулоза* в желудке и верхних отделах кишечника не всасывается и не гидролизуется. Гидролиз лактулозы происходит в толстой кишке.

## Показания к применению:

- нарушения микрофлоры кишечника, в т.ч. в результате антибиотикотерапии;
- синдром раздраженного кишечника (в составе комплексной терапии);
- гепатиты и цирроз печени (в составе комплексной терапии);
- аллергические заболевания (атопический дерматит, крапивница) - в составе комплексной терапии.

## Относится к болезням:

- [Аллергия](#)
- [Атопический дерматоз](#)
- [Гепатит](#)
- [Гепатоз](#)
- [Дерматит](#)
- [Крапивница](#)
- [Синдром раздраженного кишечника](#)

## Противопоказания:

- непроходимость кишечника;
- желудочно-кишечные кровотечения;
- галактоземия;
- повышенная чувствительность к препарату.

С *осторожностью* следует назначать препарат при обострении язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, атонии кишечника.

## **Способ применения и дозы:**

Таблетки принимают внутрь, при необходимости - после предварительного измельчения, запивая водой, за 1 ч до еды и приема других лекарственных средств.

**Взрослым и детям старше 12 лет** назначают по 2-3 таб. 3 раза/сут, **детям в возрасте от 8 до 12 лет** - по 1-2 таб. 3 раза/сут, **детям в возрасте от 3 до 7 лет** - по 1 таб. 3 раза/сут, **детям в возрасте от 1 года до 3 лет** - по 1/2 таблетки 3 раза/сут.

Средняя продолжительность курса лечения - 2-3 недели. Длительное использование препарата и повторные курсы лечения должны проводиться только по рекомендации врача.

## **Побочное действие:**

*Со стороны пищеварительной системы:* редко - метеоризм, диарея.

*Прочие:* аллергические реакции.

## **Передозировка:**

*Симптомы:* запор, боли в животе.

*Лечение:* прекращение приема препарата.

## **Применение при беременности и кормлении грудью:**

Данные о безопасности применения препарата Лактофильтрум при беременности и в период лактации отсутствуют.

## **Взаимодействие с другими лекарственными средствами:**

Возможно снижение лечебного эффекта некоторых одновременно принимаемых внутрь препаратов.

## **Особые указания и меры предосторожности:**

Препарат может использоваться в комплексной терапии совместно с другими лекарственными препаратами при соблюдении правила раздельного приема.

## **Условия хранения:**

Препарат следует хранить в сухом, защищенном от света, недоступном для детей месте при температуре не выше 30°C.

## **Срок годности:**

3 года.

## **Условия отпуска в аптеке:**

Без рецепта.

**Источник:** <http://drugs.thead.ru/Laktofiltrum>