

## [Лактоглобулин Против Условно-Патогенных Бактерий И Сальмонелл Коровий](#)



### Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)  
[Госреестр](#) [Википедия](#)  
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)<sup>англ</sup>

### Форма выпуска:

**Лиофилизат для приготовления раствора для приема внутрь** желтовато-белого цвета, легко растворимый в воде, без запаха.

	<b>1 доза</b>
иммунные глобулины молозива, содержащие антитела к сальмонеллам группы В ( <i>S.typhimurium</i> ), сальмонеллам группы Д ( <i>S.enteritidis</i> и <i>S.Dublin</i> ), протеею ( <i>P.mirabilis</i> и <i>P.vulgaris</i> ), клебсиелле ( <i>K.pneumoniae</i> ) и псевдомонас ( <i>P.aeruginosa</i> )	0.5 г

0.5 г (1 доза) - флаконы (10) - пачки картонные.

1 г (2 дозы) - флаконы (10) - пачки картонные.

### Фармакологические свойства:

#### Фармакодинамика

Содержащиеся в препарате антитела оказывают выраженное антибактериальное и антитоксическое действие в отношении сальмонелл, протеей, клебсиелл и псевдомонас.

### Показания к применению:

— лечение детей при наличии у них заболеваний сопровождающихся диареей, вызванных сальмонеллами группы В (*S.typhimurium*), сальмонеллами и группы Д (*S.enteritidis* и *S.dublin*), протеем (*P.mirabilis* и *P.vulgaris*), клебсиеллами (*K.pneumoniae*), псевдомонас (*P.aeruginosa*), а также ассоциациями этих микроорганизмов и дисбактериозов;

— профилактика сальмонеллезной инфекции у новорожденных и детей групп риска по заболеваемости острыми кишечными инфекциями (ранний перевод на искусственное или смешанное вскармливание, применение антибиотиков и химиопрепаратов, воспитание в домах ребенка), у контактных с заболевшими сальмонеллезной инфекцией.

### Относится к болезням:

- [Инфекции](#)

- [Сальмонеллез](#)

## Противопоказания:

— индивидуальная непереносимость коровьего молока.

## Способ применения и дозы:

Лактоглобулин применяют внутрь за 20-30 минут до кормления. С флакона удаляют металлический колпачок и резиновую пробку, наливают кипяченую воду комнатной температуры из расчета 10 мл (2 чайные ложки) на одну дозу препарата, перемешивают.

При разведении препарат не встряхивать.

В течение 5 минут после добавления воды должна образовываться прозрачная, слабоопалесцирующая жидкость с желтоватым оттенком.

При содержании во флаконе 2-х доз разведенный препарат, закрытый пробкой, допускается хранить при температуре от 2 до 10°C не более 1 суток.

Не пригоден к применению препарат с нарушенной целостностью упаковки, без маркировки, с изменением физических свойств, при наличии посторонних включений, при неправильном хранении, с истекшим сроком годности.

Препарат назначают в наиболее ранние сроки с момента установления диагноза: **новорожденным** - по 1 дозе 1-2 раза в сутки, **детям от 1 до 6 мес** - по 1 дозе 2 раза в сутки; **детям от 6 мес до 1 года** - по 2 дозы 2 раза в сутки; **детям старше 1 года** - по 2 дозы 2-3 раза в сутки. Курс лечения от 7 до 14 дней. В тяжелых случаях курс лечения можно продлить до 21 дня.

Лечение лактоглобулином проводят на фоне общепринятой антибактериальной и симптоматической терапии.

Для закрепления эффекта лечения, рекомендуется сочетание применения препарата с бифидумбактерином.

Для профилактики сальмонеллезной инфекции у детей групп риска в возрасте от 1 месяца и старше - по 1 дозе 2 раза в день от 10 до 14 дней. Возможно повторение курсов применения лактоглобулина с интервалом 3-4 месяца.

Для экстренной профилактики сальмонеллезной инфекции у контактных с заболевшими, **новорожденным** - по 0,5 дозы 2 раза в день, **детям от 1 мес и старше** - по 1 дозе 2 раза в день, 10 дней.

## Побочное действие:

Реакции на введение препарата не зарегистрированы.

## Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Лактоглобулин совместим с антибиотиками, препаратами нормофлоры (бифидумбактерин, бификол, бифилиз, лактобактерин, ацилакт, аципол).

## Особые указания и меры предосторожности:

### *Применение в детском возрасте*

Применяют у детей по показаниям.

## Условия хранения:

Препарат транспортируют в соответствии с СП 3.3.2.1248-03 при температуре от 2 до 10°C.

Хранить в сухом, темном и недоступном для детей месте при температуре от 2 до 10°C.

Препарат с истекшим сроком годности применению не подлежит.

**Срок годности:**

4 года.

**Условия отпуска в аптеке:**

Без рецепта.

**Источник:** [http://drugs.thead.ru/Laktoglobulin\\_Protiv\\_Uslovno-Patogennyh\\_Bakteriy\\_I\\_Salmonell\\_Koroviy](http://drugs.thead.ru/Laktoglobulin_Protiv_Uslovno-Patogennyh_Bakteriy_I_Salmonell_Koroviy)