

Лактонорм



Код АТХ:

- [G01AX14](#)

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Лактобактерии ацидофильные](#)

Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)
[Госреестр](#)^{МНН} [Википедия](#)^{МНН}
[PLC VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

↙ Суппозитории вагинальные	1 супп.
<i>Lactobacillus acidophilus</i>	не менее 100 млн. КОЕ

14 шт. - банки полимерные с кольцом первого вскрытия (1) - пачки картонные.

28 шт. - банки полимерные с кольцом первого вскрытия (1) - пачки картонные.

14 шт. - банки полимерные с кольцом первого вскрытия (1) в комплекте с аппликатором - пачки картонные.

28 шт. - банки полимерные с кольцом первого вскрытия (1) в комплекте с аппликатором - пачки картонные.

Фармакотерапевтическая группа:

- [Противомикробные, противопаразитарные и противоглистные средства](#)

Показания к применению:

Лечение и профилактика вагинальных дисбиозов. Комплексное лечение:

— острых, подострых, хронических вульвитов и вагинитов;

— постменопаузального атрофического вагинита;

— бактериального вагиноза после проведения антибактериальной терапии.

Профилактика послеоперационных инфекционных осложнений, дисбиотических изменений урогенитального тракта на фоне антибактериальной терапии.

Подготовка к проведению плановых гинекологических операций и предродовая подготовка беременных женщин, входящих в группу риска в отношении воспалительных заболеваний.

Относится к болезням:

- [Вагинит](#)
- [Вульвит](#)
- [Инфекции](#)

Противопоказания:

Вульвовагинальный кандидоз.

Способ применения и дозы:

С лечебной целью: 1 вагинальная капсула 2 раза в день (утром и вечером) в течение 7 дней. В случае необходимости курс лечения может быть продлен.

С профилактической целью: 1 вагинальная капсула 1 раз в день на ночь в течение 7-14 дней.

Лечение и/или профилактику следует проводить сразу после менструации.

Введение вагинальных капсул без аппликатора.

Тщательно моют руки с мылом.

В положении лежа на спине вводят вагинальную капсулу пальцем как можно глубже во влагалище.

Введение вагинальных капсул при помощи аппликатора.

Вагинальную капсулу помещают в отверстие аппликатора, слегка оттягивая поршень, чтобы зафиксировать капсулу. В положении лежа на спине, вводят аппликатор передним концом с капсулой во влагалище как можно глубже, не вызывая при этом неприятных ощущений. Медленно нажимают на поршень до упора для выхода капсулы. Осторожно извлекают аппликатор и разбирают его, вытянув поршень. Промывают поршень и внутреннюю поверхность аппликатора теплой водой с мылом. Ополаскивают кипяченой водой и сушат в разобранном виде при комнатной температуре. Перед использованием собирают аппликатор, вставляя поршень в более узкую часть трубки аппликатора.

Побочное действие:

При применении в рекомендуемых дозах побочные действия не обнаружены. В редких случаях возможно появление аллергических реакций.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Препарат можно использовать в период беременности и лактации. Использование аппликатора во время беременности не рекомендуется.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Лактонорм может быть использован в сочетании с другими лекарственными средствами. Применение препарата возможно после местного введения антибактериальных препаратов и/или антисептиков.

Особые указания и меры предосторожности:

Применение у больных в возрасте до 18 лет определяется врачом с учетом характера заболевания и индивидуальных биологических особенностей.

Применение в детском возрасте

Применение у больных в возрасте до 18 лет определяется врачом с учетом характера заболевания и индивидуальных биологических особенностей.

Условия хранения:

В соответствии с СП 3.3.2.1248-03 при температуре не выше 10°C. Хранить в недоступном для детей месте.

Срок хранения. 2 года. Не использовать после окончания срока годности, указанного на упаковке.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: <http://drugs.thead.ru/Laktonorm>