

Ламизил Дермгель



Код АТХ:

- [D01AE15](#)

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Тербинафин](#)

Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)

[Госреестр](#)^{МНН} [Википедия](#)^{МНН}

[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

◇ *Гель для наружного применения 1%* блестящий, от белого до почти белого цвета.

	1 г
тербинафин	10 мг

Вспомогательные вещества: бензиловый спирт, карбомер (карбопол 974Р), изопропилмиристат, бутилгидрокситолуол, сорбитана лаурат, полисорбат 20, натрия гидроксид, этанол, вода очищенная, азот.

5 г - тубы алюминиевые (1) - коробки картонные.

15 г - тубы алюминиевые (1) - коробки картонные.

30 г - тубы алюминиевые (1) - коробки картонные.

Фармакотерапевтическая группа:

- [Противомикробные, противопаразитарные и противоглистные средства](#)

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Противогрибковый препарат для наружного применения, обладающий широким спектром противогрибковой активности. В небольших концентрациях тербинафин оказывает фунгицидное действие в отношении дерматофитов (*Trichophyton rubrum*, *Trichophyton mentagrophytes*, *Trichophyton verrucosum*, *Trichophyton violaceum*, *Trichophyton tonsurans*, *Microsporum canis*, *Epidermophyton floccosum*), плесневых (в основном *Candida albicans*) и некоторых диморфных грибов (*Pityrosporum orbiculare*). Активность в отношении дрожжевых грибов, в зависимости от их вида, может быть фунгицидной или фунгистатической.

Тербинафин специфическим образом изменяет ранний этап биосинтеза стеролов, происходящего в грибах. Это ведет к дефициту эргостерола и к внутриклеточному накоплению сквалена, что вызывает гибель клетки гриба. Действие тербинафина осуществляется путем ингибирования фермента скваленэпоксидазы, расположенного на клеточной мембране гриба.

Тербинафин не оказывает влияния на систему цитохрома P450 у человека и, соответственно, на метаболизм гормонов или других лекарственных препаратов.

Фармакокинетика

При наружном применении абсорбция тербинафина составляет менее 5%. Системное действие выражено незначительно.

Показания к применению:

— грибковые инфекции кожи, в т.ч. микозов стоп (*tinea pedis*), паховой эпидермофитии (*tinea cruris*), грибковых поражений гладкой кожи тела (*tinea corporis*), вызванные дерматофитами, такими как *Trichophyton* (в т.ч. *Trichophyton rubrum*, *Trichophyton mentagrophytes*, *Trichophyton verrucosum*, *Trichophyton violaceum*), *Microsporum canis* и *Epidermophyton floccosum*;

— разноцветный лишай (*Pityriasis versicolor*), вызываемый *Pityrosporum orbiculare* (*Malassezia furfur*).

Относится к болезням:

- [Дерматит](#)
- [Дерматофития](#)
- [Инфекции](#)
- [Лишай](#)
- [Разноцветный лишай](#)
- [Эпидермофития](#)

Противопоказания:

— детский возраст до 12 лет;

— период лактации (грудного вскармливания);

— повышенная чувствительность к тербинафину или к любому другому компоненту препарата.

Способ применения и дозы:

Ламизил Дермгель применяют наружно у **взрослых и детей с 12 лет** 1 раз/сут по любому из показаний. Перед применением препарата необходимо тщательно очистить и подсушить пораженные участки. Препарат слегка втирают в участки как пораженной, так и прилегающей интактной кожи. В случае инфекций, сопровождающихся опрелостями (под молочными железами, между пальцев, в ягодичных и паховых складках), область нанесения геля можно прикрыть марлей, особенно в ночное время.

Продолжительность и кратность применения препарата Ламизил Дермгель при *дерматомикозе туловища, голеней* - 1 неделя, 1 раз/сут; при *дерматомикозе стоп* - 1 неделя, 1 раз/сут; при *разноцветном лишае* - 1 неделя, 1 раз/сут.

Уменьшение выраженности клинических проявлений обычно отмечается в первые дни лечения. В случае нерегулярного лечения или преждевременного его прекращения имеется риск рецидива инфекции. В том случае, если через неделю лечения не отмечается признаков улучшения, следует верифицировать диагноз.

Для **пациентов пожилого возраста** не требуется коррекции режима дозирования.

Перед первым применением препарата Ламизил Дермгель следует проколоть запечатывающую мембрану при помощи острого, расположенного снаружи заворачивающегося колпачка.

Побочное действие:

Местные реакции: редко - покраснение, ощущение зуда или жжения. Эти явления редко приводили к необходимости прекращать лечение.

Аллергические реакции: редко - генерализованная сыпь и/или покраснение, крапивница, ангионевротический отек. При развитии указанных эффектов необходимо прекратить лечение.

Передозировка:

О случаях передозировки не сообщалось.

Симптомы: при случайном приеме препарата внутрь возможны головная боль, тошнота, боли в эпигастрии и головокружение.

Лечение: проводят симптоматическую терапию.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Клинический опыт применения препарата Ламизил Дермгель для наружного применения при беременности ограничен, поэтому препарат можно применять только по строгим показаниям.

Тербинафин выделяется с грудным молоком, поэтому его не следует назначать кормящим матерям.

В экспериментальных исследованиях тератогенных свойств тербинафина не выявлено. До настоящего времени не сообщалось о каких-либо пороках развития при применении препарата Ламизил Дермгель.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

В настоящее время лекарственное взаимодействие препарата Ламизил Дермгель не описано.

Особые указания и меры предосторожности:

Препарат предназначен только для наружного применения.

С осторожностью следует наносить Ламизил Дермгель на поврежденные участки кожи, т.к. спирт может вызвать раздражение.

Следует избегать попадания препарата в глаза, т.к. возможно развитие раздражения. При случайном попадании препарата в глаза их следует немедленно промыть проточной водой, а в случае развития стойких явлений раздражения пациент должен обратиться к врачу.

При отсутствии признаков улучшения через 1 неделю терапии следует верифицировать диагноз.

В случае развития каких-либо побочных явлений пациент должен сообщить об этом лечащему врачу.

Применение в пожилом возрасте

Для **пациентов пожилого возраста** не требуется коррекции режима дозирования.

Применение в детском возрасте

Противопоказание: детский возраст до 12 лет.

Условия хранения:

Препарат следует хранить в недоступном для детей месте при температуре не выше 30°C.

Срок годности:

3 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Lamizil_Dermgel