

[Ландышево-Пустырниковые Капли](#)



Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)
[Госреестр](#) [Википедия](#)
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Комбинированный препарат растительного происхождения, оказывает кардиотоническое и седативное действие.

Показания к применению:

В качестве седативного средства в комплексной терапии:

- повышенной нервной возбудимости;
- бессонницы;
- артериальной гипертензии (на ранних стадиях).

Относится к болезням:

- [Артериальная гипертензия](#)
- [Бессонница](#)
- [Гипертензия](#)

Противопоказания:

- гиперчувствительность;
- распространенный атеросклероз;
- кардиосклероз;
- эндокардит;
- миокардит.

Способ применения и дозы:

Внутри, по 15-20 капель 2-3 раза/сут, **детям** - 1-12 кап. (в зависимости от возраста) 2-3 раза/сут.

Побочное действие:

Тошнота, рвота, диарея, аритмии, миастения, головная боль, аллергические реакции.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Усиливает действие снотворных и других угнетающих ЦНС лекарственных средств, а также анальгетических препаратов.

Особые указания и меры предосторожности:

Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами

При длительном применении в больших дозах возможно снижение скорости психомоторных реакций, что следует учитывать при вождении транспорта, работе с механизмами и т.д.

Применение в детском возрасте

Детям назначают по 1-12 кап. (в зависимости от возраста) 2-3 раза/сут.

Источник: http://drugs.thead.ru/Landyshevo-Pustyrnikovye_Kapli