

Ланотан



Код АТХ:

- [S01EE01](#)

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Латанопрост](#)

Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#) [Апрель](#)
[Госреестр](#)^{МНН} [Википедия](#)^{МНН}
[РЛС](#) [VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

Капли глазные, 0,05 мг/мл. Во флаконах ПЭ, укупоренных капельницами и крышками ПЭ винтовыми с контролем вскрытия, 2,5 мл. На каждый флакон наклеена этикетка самоклеющаяся. 1 фл. в пачке из картона.

Состав:

Капли глазные	1 мл
активное вещество:	
латанопрост в пересчете на 100% сухое вещество	0,05 мг
вспомогательные вещества: бензалкония хлорид в пересчете на 100% вещество — 0,2 мг; натрия хлорид — 4 мг; натрия дигидрофосфат моногидрат — 4,5 мг; натрия гидрофосфат безводный — 4,7 мг; вода для инъекций — до 1 мл	

Фармакотерапевтическая группа:

- [Интермедианты](#)
- [Органотропные средства](#)

Фармакологические свойства:

Фармакологическое действие — понижающее внутриглазное давление, противоглаукомное.

Фармакодинамика

Противоглаукомное средство. Аналог простагландина $F_{2\alpha}$, является селективным антагонистом FP-рецепторов. Снижает внутриглазное давление путем увеличения увеосклерального оттока водянистой влаги. Не оказывает существенного влияния на продукцию водянистой влаги и гемато-офтальмический барьер.

Представляет собой изопропиловый эфир – неактивный предшественник, при гидролизе которого происходит образование фармакологически активной кислоты латанопроста.

Показания к применению:

Повышение внутриглазного давления при открытоугольной глаукоме и повышенном офтальмотонусе.

Относится к болезням:

- [Глаукома](#)

Противопоказания:

Повышенная чувствительность к латанопросту.

Способ применения и дозы:

По 1 капле в пораженный глаз 1 раз/сут, предпочтительнее вечером.

Побочное действие:

Возможно: ощущение инородного тела в глазу, слабая или умеренная гиперемия, точечные эпителиальные эрозии.

В единичных случаях: макулярный отек у пациентов с афакией или псевдофакией с хрусталиком в передней камере глаза.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Применение при беременности и лактации возможно в случаях, когда ожидаемая польза лечения для матери превышает потенциальный риск для плода или ребенка.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

При одновременном применении с тимололом, адреномиметиками, ацетазоламидом, пилокарпином наблюдается аддитивное действие на внутриглазное давление.

Особые указания и меры предосторожности:

С осторожностью применять при вторичной (вследствие воспалительного заболевания или травмы), врожденной глаукоме, при открытоугольной глаукоме у пациентов с псевдофакией, а также при пигментной форме глаукомы; закрытоугольной глаукоме (в т.ч. при остром приступе).

Латанопрост может вызвать постепенное изменение цвета глаз за счет увеличения коричневого пигмента в радужке. Это наблюдается преимущественно у пациентов со смешанной окраской радужки и не сопровождается какими-либо клиническими симптомами или патологическими изменениями, но может быть необратимым.

Следует иметь в виду, что латанопрост и его метаболиты могут выделяться с грудным молоком.

Безопасность применения у детей не установлена, поэтому применение в педиатрии не рекомендуется.

Следует с осторожностью применять у пациентов, занимающихся потенциально опасными видами деятельности,

Ланотан

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

требующими высокой скорости психомоторных реакций.

Источник: <http://drugs.thead.ru/Lanotan>