Ларипронт



Код АТХ:

- R02AA20

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- Деквалиния хлорид
- Лизоцима гидрохлорид

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр[МНН] [МНН] Википедия[МНН] [МНН] Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

Форма выпуска, описание и состав

◊ ***Таблетки для рассасывания***	**1 таб.**
лизоцима гидрохлорид	10 мг
деквалиния хлорид	250 мкг

10 шт. - упаковки ячейковые контурные (2) - пачки картонные.

Фармакотерапевтическая группа:

- Противомикробные, противопаразитарные и противоглистные средства

Фармакологические свойства:

Фармакологическое действие — противовоспалительное, муколитическое, противовирусное, противомикробное.

Фармакодинамика

Лизоцим - природный фермент (мукополисахаридаза), образуя комплекс с вирусами и предотвращая их проникновение в клетки, оказывает противовирусное действие. Обладает противомикробным действием в отношении грамположительных и некоторых грамотрицательных бактерий за счет разрушения клеточной стенки микроорганизмов. Кроме того, лизоцим оказывает противовоспалительное, гемостатическое и муколитическое действие за счет блокады гистамина, инактивации гепарина и расщепления мукополисахаридов.

Деквалиния хлорид - антисептик, эффективный в отношении грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов, а также грибов. Обладая способностью снижать поверхностное натяжение, обеспечивает проникновение действующих веществ в более глубоко расположенные участки слизистой оболочки.

Показания к применению:

Инфекционно-воспалительные заболевания слизистой оболочки полости рта, глотки и гортани (гингивит, пародонтит, стоматит (в т.ч. кандидоз, молочница), фарингит, ларингит, ангина); профилактика ОРВИ; боль в горле и охриплость голоса; до и после хирургических вмешательств в полости рта и глотки (стоматологические операции, операции на челюсти, гайморовых пазухах, миндалинах).

Относится к болезням:

- Ангина
- Гайморит
- Гингивит
- Ларингит
- Молочница
- ОРВИ
- Пародонтит
- Стоматит
- Фарингит

Противопоказания:

Повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Способ применения и дозы:

Препарат следует держать во рту, не разжевывая и не глотая, до полного растворения. После рассасывания таблетки следует воздерживаться от приема пищи или жидкости в течение 30 мин.

Рекомендуемая доза - по 1 таб. каждые 2-3 ч.

Побочное действие:

Диагнозы

- Боли в горле
- Гайморит
- Заболевания уха
- Ларингит

Применение при беременности и кормлении грудью:

При беременности и в период лактации возможно применение препарата по показаниям.

Особые указания и меры предосторожности:

Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами

Препарат не влияет на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами.

Источник: http://drugs.thead.ru/Laripront