

## Латанопрост-Тева



### Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#) [Апрель](#)  
[Госреестр](#) [Википедия](#)  
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)<sup>англ</sup>

### Форма выпуска:

#### **Форма выпуска, описание и состав**

**Капли глазные 0.005%** в виде прозрачного, бесцветного раствора без видимых включений.

|             |             |
|-------------|-------------|
|             | <b>1 мл</b> |
| латанопрост | 0.05 мг     |

Вспомогательные вещества: бензалкония хлорида раствор 50% - 0.4 мг (соответствует 0.2 мг бензалкония хлорида), натрия хлорид - 4.1 мг, натрия дигидрофосфата дигидрат - 5.2 мг, натрия гидрофосфата додекагидрат - 11.96 мг (соответствует 4.74 мг динатрия фосфата безводного), вода очищенная - от 0.99 до 1.01 мг.

2.5 мл - флаконы-капельницы полиэтиленовые (1) - пачки картонные.

2.5 мл - флаконы-капельницы полиэтиленовые (3) - пачки картонные.

### Фармакологические свойства:

#### **Фармакодинамика**

Противоглаукомное средство. Аналог простагландина  $F_{2\alpha}$ , является селективным антагонистом FP-рецепторов. Снижает внутриглазное давление путем увеличения увеосклерального оттока водянистой влаги. Не оказывает существенного влияния на продукцию водянистой влаги и гемато-офтальмический барьер.

Представляет собой изопропиловый эфир – неактивный предшественник, при гидролизе которого происходит образование фармакологически активной кислоты латанопроста.

### Показания к применению:

Повышение внутриглазного давления при открытоугольной глаукоме и повышенном офтальмотонусе.

### Относится к болезням:

- [Глаукома](#)

### Противопоказания:

Повышенная чувствительность к латанопросту.

## **Способ применения и дозы:**

По 1 капле в пораженный глаз 1 раз/сут, предпочтительнее вечером.

## **Побочное действие:**

*Возможно:* ощущение инородного тела в глазу, слабая или умеренная гиперемия, точечные эпителиальные эрозии.

*В единичных случаях:* макулярный отек у пациентов с афакией или псевдофакией с хрусталиком в передней камере глаза.

## **Применение при беременности и кормлении грудью:**

Применение при беременности и лактации возможно в случаях, когда ожидаемая польза лечения для матери превышает потенциальный риск для плода или ребенка.

## **Взаимодействие с другими лекарственными средствами:**

При одновременном применении с тимололом, адреномиметиками, ацетазоламидом, пилокарпином наблюдается аддитивное действие на внутриглазное давление.

## **Особые указания и меры предосторожности:**

С осторожностью применять при вторичной (вследствие воспалительного заболевания или травмы), врожденной глаукоме, при открытоугольной глаукоме у пациентов с псевдофакией, а также при пигментной форме глаукомы; закрытоугольной глаукоме (в т.ч. при остром приступе).

Латанопрост может вызвать постепенное изменение цвета глаз за счет увеличения коричневого пигмента в радужке. Это наблюдается преимущественно у пациентов со смешанной окраской радужки и не сопровождается какими-либо клиническими симптомами или патологическими изменениями, но может быть необратимым.

Следует иметь в виду, что латанопрост и его метаболиты могут выделяться с грудным молоком.

Безопасность применения у детей не установлена, поэтому применение в педиатрии не рекомендуется.

Следует с осторожностью применять у пациентов, занимающихся потенциально опасными видами деятельности, требующими высокой скорости психомоторных реакций.

**Источник:** <http://drugs.thead.ru/Latanoprost-Teva>