

Лавакол



Код АТХ:

- [A06AX](#)

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Макрогол](#)

Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)
[Госреестр](#)^{МНН} [Википедия](#)^{МНН}
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Фармакотерапевтическая группа:

- [Органотропные средства](#)

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Оказывает слабительное действие.

Макрогол препятствует всасыванию воды из ЖКТ и способствует ускоренной эвакуации кишечного содержимого.

Электролиты препятствуют нарушению водно-электролитного баланса.

Показания к применению:

— подготовка к эндоскопическому или рентгенологическому исследованию толстой кишки, оперативным вмешательствам.

Противопоказания:

- тяжелое общее состояние пациента (в т.ч. дегидратация, хроническая сердечная недостаточность);
- кишечная непроходимость;
- токсический мегаколон;
- стеноз желудка;
- перфорация ЖКТ;
- эрозивно-язвенные поражения ЖКТ;
- ХПН.

Способ применения и дозы:

Внутрь, натощак, за 18-20 ч до исследования или операции.

Содержимое пакетика растворяют в 200 мл воды. Принимают 3 л (по 200 мл каждые 20 мин). Во время приема и после него необходимо употребление только жидкой пищи. Рекомендуемые часы приема препарата - 14:00-19:00. После 22:00 прием пищи не показан.

Побочное действие:

Тошнота, рвота, тяжесть и дискомфорт в брюшной полости при приеме первых доз препарата.

Особые указания и меры предосторожности:

При нарушениях функции почек

Противопоказание — ХПН.

Условия отпуска в аптеке:

По рецепту.

Источник: <http://drugs.thead.ru/Lavakol>