

Лептандра композитум



Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#) [Апрель](#)
[Госреестр](#) [Википедия](#)
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

♦ **Капли для приема внутрь гомеопатические** от бесцветного до светло-желтого цвета, прозрачные, с запахом этанола.

	100 г
Veronica virginica (Leptandra) (вероника виргиника (лептандра)) D2	1 г
Cassia amara (квассия амара) D3	1 г
Podophyllum peltatum (Podophyllum) (подофиллум пельтатум (подофиллум)) D3	1 г
Acidum arsenicosum (Arsenicum album) (ацидум арсеникозум (арсеникум альбум)) D4	1 г
Carbo vegetabilis (карбо вегетабилис) D10	1 г
Niccolum metallicum (Niccolum) (никколюм металликум (никколюм)) D10	1 г
Phosphorus (фосфорус) D6	1 г

Вспомогательные вещества: этанол (около 35 об.%).

30 мл - флакон-капельницы темного стекла (1) - пачки картонные.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Гомеопатическое средство.

Показания к применению:

— в комплексной терапии диспепсических расстройств (изжога, тошнота, метеоризм, боли в эпигастральной области), обусловленных заболеваниями печени и желчного пузыря.

Относится к болезням:

- [Диспепсия](#)
- [Метеоризм](#)
- [Тошнота](#)

Противопоказания:

- беременность;
- период грудного вскармливания;
- детский возраст до 12 лет;
- повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Способ применения и дозы:

Препарат назначают внутрь по 10 капель (растворенных в 30 мл воды) 3 раза в день за 30 минут до или через 1 час после еды. При острых симптомах принимать по 10 капель каждый час или каждые полчаса, но не более 12 раз в день. Длительность терапии определяется врачом.

Побочное действие:

Возможны аллергические реакции.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Противопоказан при беременности и лактации.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Назначение комплексных гомеопатических препаратов не исключает использование других лекарственных средств, применяемых при данном заболевании.

Особые указания и меры предосторожности:

При приеме гомеопатических лекарственных средств могут временно обостряться имеющиеся симптомы (первичное ухудшение). В этом случае следует прервать прием препарата и обратиться к лечащему врачу. При отсутствии терапевтического эффекта, а также появлении побочных эффектов, не описанных в инструкции по медицинскому применению, следует сообщить об этом врачу.

При желтухе, устойчивых, неясных или возобновляющихся симптомах следует обратиться к врачу.

Длительное применение препарата (в течение нескольких месяцев и более) должно проводиться под наблюдением врача.

Препарат содержит этиловый спирт около 35 % (объемных).

Применение в детском возрасте

Противопоказан детям до 12 лет.

Условия хранения:

В сухом, защищенном от света месте при температуре от 15°C до 25°C. Хранить в недоступном для детей месте!

Срок годности:

5 лет.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Leptandra_kompozitum