

[Леспефрил](#)



Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Леспедезы двухцветной побеги](#)

Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)
[Госреестр](#)^{МНН} [Википедия](#)^{МНН}
[PLC VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

Раствор для приема внутрь	100 мл
побеги леспедезы двухцветной	70.8 г

100 мл - флаконы (1) - пачки картонные.

100 мл - флаконы темного стекла (1) - пачки картонные.

100 мл - банки темного стекла (1) - пачки картонные.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Способствует увеличению почечной фильтрации, уменьшает азотемию, увеличивает выведение азотистых шлаков с мочой, повышает диурез и выведение ионов натрия и в меньшей степени ионов калия.

Показания к применению:

— хроническая почечная недостаточность (симптоматическая терапия).

Противопоказания:

- беременность, период грудного вскармливания;
- заболевания печени;
- алкоголизм;
- эпилепсия;
- черепно-мозговые травмы;
- заболевания головного мозга;
- возраст до 18 лет;
- повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата.

Способ применения и дозы:

Внутрь, по 5-15 мл (1 чайная - 1 столовая ложка) 3-4 раза в сутки. Допускается разбавление препарата водой перед употреблением. Курс лечения составляет 3-4 недели. Проведение повторного курса лечения возможно через 2-3 недели после консультации с врачом.

Побочное действие:

Возможны аллергические реакции. В редких случаях - гипонатриемия. Если любые из указанных в инструкции побочных эффектов усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

Передозировка:

При передозировке возможно усиление побочных эффектов.

Лечение: симптоматическое.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Противопоказан при беременности и в период лактации.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

В связи с содержанием этанола в препарате противопоказан одновременный прием дисульфирама, седативных лекарственных средств, неселективных ингибиторов моноаминоксидазы, инсулина, метформина, сульфонамида. При совместном назначении нескольких лекарственных средств необходимо принимать во внимание наличие этанола в препарате, так как он может изменять или усиливать действие других препаратов.

Особые указания и меры предосторожности:

При развитии гипонатриемии ее следует компенсировать введением препаратов, содержащих ионы натрия.

Препарат содержит не менее 40% этанола. В максимальной разовой дозе препарата содержание этанола составляет не менее 4,7 г, в максимальной суточной дозе - не менее 18,8 г.

Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами

В период лечения необходимо соблюдать осторожность при управлении транспортными средствами и занятиях другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

При нарушениях функции почек

Леспепфрил

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

Применяется в симптоматической терапии ХПН.

При нарушениях функции печени

Противопоказан при заболеваниях печени.

Применение в детском возрасте

Противопоказан детям до 18 лет.

Условия хранения:

Хранить в защищенном от света месте при температуре от 15 до 25°C. Хранить в недоступном для детей месте. Не применять по истечении срока годности.

Срок годности:

3 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: <http://drugs.thead.ru/Lespefril>