Левомеколь



Код АТХ:

- D06C

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- Диоксометилтетрагидропиримидин
- Хлорамфеникол

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр[МНН] [МНН] Википедия[МНН] [МНН] Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

Мазь для наружного применения 40 г - тубы алюминиевые (1) - пачки картонные.
Мазь для наружного применения 100 г - банки темного стекла (1) - пачки картонные.
Мазь для наружного применения 1000 г - банки темного стекла (1) - бумага оберточная.

Состав:

100 г мази содержат

Активные вещества: хлорамфеникол 0,75 г, метилурацил 4,0 г

Вспомогательные вещества: полиэтиленоксид 1500; полиэтиленоксид 400 — до 100.

Описание:

Мазь белого или белого с желтоватым отттенком цвета.

Фармакотерапевтическая группа:

- Противомикробные, противопаразитарные и противоглистные средства

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Комбинированный препарат для местного применения, оказывает противовоспалительное (дегидратирующее) и противомикробное действие, активен в отношении грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов (стафилококков, синегнойной и кишечной палочек). Легко проникает в глубь тканей без повреждения биологических мембран, стимулирует процессы регенерации. В присутствии гноя и некротических масс антибактериальное действие сохраняется.

Показания к применению:

Гнойные раны (в т.ч. инфицированные смешанной микрофлорой) в первой (гнойно-некротической) фазе раневого процесса.

Относится к болезням:

- Раны

Противопоказания:

Препарат не должен применяться при наличии какого-либо из состояний, перечисленных ниже:

— повышенная гиперчувствительность к компонентам препарата;

— детский возраст до 1 года (у новорожденных биотрансформация хлорамфеникола проходит более медленно, чем у взрослых).

Способ применения и дозы:

Наружно. Препаратом пропитывают стерильные марлевые салфетки, которыми рыхло заполняют рану. Возможно введение в гнойные полости через катетер (дренажную трубку) с помощью шприца. В этом случае мазь предварительно подогревают до 35–36 °С. Перевязки производят ежедневно, один раз в день, до полного очищения раны от гнойно-некротических масс. При больших раневых поверхностях суточная доза мази при пересчете на хлорамфеникол не должна превышать 3г.

Длительность применения зависит от тяжести и течения заболевания.

Побочное действие:

Возможны местные аллергические реакции (кожные высыпания).

Передозировка:

О случаях передозировки препарата Левомиколь маль не сообщалось.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Случаи взаимодействия или несовместимости с другими лекарственными средствами не описаны.

Условия хранения:

В сухом, защищенном от света месте, при температуре не выше 20 °С.

Срок годности:

3,5 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Levomekol