

Левометил



Код АТХ:

- [D06C](#)

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Диоксометилтетрагидропиримидин](#)
- [Хлорамфеникол](#)

Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)
[Госреестр](#)^{МНН МНН} [Википедия](#)^{МНН МНН}
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Фармакотерапевтическая группа:

- [Противомикробные, противопаразитарные и противоглистные средства](#)

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Комбинированный препарат для местного применения, оказывает противовоспалительное (дегидратирующее) и противомикробное действие, активен в отношении грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов (стафилококков, синегнойных и кишечных палочек).

Легко проникает в глубину тканей без повреждения биологических мембран, стимулирует процессы регенерации.

В присутствии гноя и некротических масс антибактериальное действие сохраняется.

Показания к применению:

— гнойные раны (в т.ч. инфицированные смешанной микрофлорой) в первой (гнойно-некротической) фазе раневого процесса.

Относится к болезням:

- [Раны](#)

Противопоказания:

Левометил

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

— гиперчувствительность.

Способ применения и дозы:

Местно. Препаратом пропитывают стерильные марлевые салфетки, которыми рыхло заполняют рану. Возможно введение в гнойные полости через катетер (дренажную трубку) с помощью шприца. В этом случае мазь предварительно подогревают до 35-36°C. Перевязки производят ежедневно, до полного очищения раны от гнойно-некротических масс.

Побочное действие:

Аллергические реакции (кожные высыпания).

Источник: <http://drugs.thead.ru/Levometil>