

Левомецетин (капли)



Код АТХ:

- [J01BA01](#)

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Хлорамфеникол](#)

Полезные ссылки:

[Цена в Яндексе](#) [Горздрав](#) [Столички](#) [Апрель](#)
[Госреестр](#)^{МНН} [Википедия](#)^{МНН}
[PLC VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

Капли глазные 0.25%	1 мл
хлорамфеникол	2.5 мг

5 мл - флакон-капельницы полимерные (1) - пачки картонные.

10 мл - флакон-капельницы полимерные (1) - пачки картонные.

Фармакотерапевтическая группа:

- [Противомикробные, противопаразитарные и противоглистные средства](#)

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Левомецетин является антибиотиком широкого спектра действия; эффективен в отношении многих грамположительных кокков (гонококков и менингококков), различных бактерий (кишечная и гемофильная палочки, сальмонеллы, шигеллы, клебсиеллы, серрации, иерсэнии, протей), риккетсий, спирохет и некоторых крупных вирусов. Препарат активен в отношении штаммов, устойчивых к пенициллину, стрептомицину, сульфаниламидам. Слабоактивен в отношении кислотоустойчивых бактерий, синегнойной палочки, клостридий и простейших.

Действует бактериостатически. Механизм антибактериального действия связан с нарушением синтеза белков микроорганизмов.

Лекарственная устойчивость к препарату развивается относительно медленно, при этом, как правило, перекрестной устойчивости к другим химиотерапевтическим средствам не возникает.

Фармакокинетика

Терапевтическая концентрация левомецетина при местном применении создается в роговице, водянистой влаге, радужной оболочке, стекловидном теле; в хрусталик препарат не проникает.

Левомецетин (капли)

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

Выводится в основном с мочой в виде неактивных метаболитов.

Показания к применению:

Профилактика и лечение инфекционных заболеваний глаз:

- конъюнктивит;
- блефарит;
- кератит.

Относится к болезням:

- [Блефарит](#)
- [Инфекции](#)
- [Кератит](#)

Противопоказания:

- угнетение кроветворения;
- заболевания кожи (псориаз, экзема, грибковые заболевания);
- беременность;
- новорожденные дети;
- индивидуальная непереносимость препарата.

Способ применения и дозы:

Препарат закапывают в конъюнктивальный мешок по 1 капле 3-4 раза/сут.

Если больной применяет препарат по своему усмотрению, то не рекомендуется применять более трех дней без консультации врача.

Побочное действие:

Возможно развитие аллергических реакций.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Противопоказан при беременности.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Для предупреждения усиления угнетающего влияния на кроветворение не рекомендуется совместное применение с сульфаниламидными препаратами.

Особые указания и меры предосторожности:

Применение в детском возрасте

Противопоказан новорожденным.

Условия хранения:

Список Б. Хранить в защищенном от света, недоступном для детей месте при температуре не выше 30°C. После вскрытия флакона использовать раствор в течение 30 дней.

Срок годности:

2 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Levomicetin_kapli