Левомицетин (капли)



Код АТХ:

- J01BA01

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- Хлорамфеникол

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр[МНН] Википедия[МНН] Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

Капли глазные 0.25%	**1 мл**
хлорамфеникол	2.5 мг

5 мл - флакон-капельницы полимерные (1) - пачки картонные.
10 мл - флакон-капельницы полимерные (1) - пачки картонные.

Фармакотерапевтическая группа:

- Противомикробные, противопаразитарные и противоглистные средства

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Левомицетин является антибиотиком широкого спектра действия; эффективен в отношении многих грамположительных кокков (гонококков и менингококков), различных бактерий (кишечная и гемофильная палочки, сальмонеллы, шигеллы, клебсиеллы, серрации, иерсbнии, протей), риккетсий, спирохет и некоторых крупных вирусов. Препарат активен в отношении штаммов, устойчивых к пенициллину, стрептомицину, сульфаниламидам. Слабоактивен в отношении кислотоустойчивых бактерий, синегнойной палочки, клостридий и простейших.

Действует бактериостатически. Механизм антибактериального действия связан с нарушением синтеза белков микроорганизмов.

Лекарственная устойчивость к препарату развивается относительно медленно, при этом, как правило, перекрестной устойчивости к других химиотерапевтическим средствам не возникает.

Фармакокинетика

Терапевтическая концентрация левомицетина при местном применении создается в роговице, водянистой влаге, радужной оболочке, стекловидном теле; в хрусталик препарат не проникает.

Выводится в основном с мочой в виде неактивных метаболитов.

Показания к применению:

Профилактика и лечение инфекционных заболеваний глаз:

— конъюктивит;

— блефарит;

— кератит.

Относится к болезням:

- Блефарит
- Инфекции
- Кератит

Противопоказания:

— угнетение кроветворения;

— заболевания кожи (псориаз, экзема, грибковые заболевания);

— беременность;

— новорожденные дети;

— индивидуальная непереносимость препарата.

Способ применения и дозы:

Препарат закапывают в конъюктивальный мешок по 1 капле 3-4 раза/сут.

Если больной примняет препарат по своему усмотрению, то не рекомендуется применять более трех дней без консультации врача.

Побочное действие:

Возможно развитие аллергических реакций.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Противопоказан при беременности.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Для предупреждения усиления угнетающего влияния на кровотворение не рекомендуется совместное применение с сульфаниламидными препаратами.

Особые указания и меры предосторожности:

Применение в детском возрасте

Противопоказан новорожденным.

Условия хранения:

Список Б. Хранить в защищенном от света, недоступном для детей месте при температуре не выше 30°С. После вскрытия флакона использовать раствор в течение 30 дней.

Срок годности:

2 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Levomicetin_kapli