

## [Левомикон-Тфф](#)



### Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)  
[Госреестр](#) [Википедия](#)  
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)<sup>англ</sup>

### Форма выпуска:

#### **Форма выпуска, описание и состав**

◇ **Мазь для наружного применения** белого или белого с желтоватым оттенком цвета.

	<b>100 г</b>
диоксометилтетрагидропиримидин	4 г
хлорамфеникол	0.75 мг

Вспомогательные вещества: макрогол 1500 - 19.05 мг, макрогол 400 - 76.2 г.

20 г - банки (1) - пачки картонные.  
25 г - банки (1) - пачки картонные.  
30 г - банки (1) - пачки картонные.  
40 г - банки (1) - пачки картонные.  
50 г - банки (1) - пачки картонные.  
60 г - банки (1) - пачки картонные.  
70 г - банки (1) - пачки картонные.  
80 г - банки (1) - пачки картонные.  
100 г - банки (1) - пачки картонные.  
20 г - тубы (1) - пачки картонные.  
25 г - тубы (1) - пачки картонные.  
30 г - тубы (1) - пачки картонные.  
40 г - тубы (1) - пачки картонные.  
50 г - тубы (1) - пачки картонные.  
60 г - тубы (1) - пачки картонные.  
70 г - тубы (1) - пачки картонные.  
80 г - тубы (1) - пачки картонные.  
100 г - тубы (1) - пачки картонные.

### Фармакологические свойства:

#### **Фармакодинамика**

Комбинированное лекарственное средство для местного применения, оказывает противовоспалительное (дегидратирующее) и противомикробное действие, активен в отношении грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов (стафилококков, синегнойных и кишечных палочек).

Легко проникает в глубину тканей без повреждения биологических мембран, стимулирует процессы регенерации.

В присутствии гноя и некротических масс антибактериальное действие сохраняется.

Диоксометилтетрагидропиримидин, нормализуя нуклеиновый обмен, стимулирует процессы регенерации в ранах,

рост и грануляционное созревание ткани, эпителизацию, оказывает противовоспалительное (дегидратирующее) действие.

### Показания к применению:

Гнойные раны (в т.ч. инфицированные смешанной микрофлорой) в первой (гнойно-некротической) фазе раневого процесса.

### Относится к болезням:

- [Раны](#)

### Противопоказания:

Детский возраст до 1 года (у новорожденных биотрансформация хлорамфеникола происходит более медленно, чем у взрослых); повышенная чувствительность к компонентам комбинации.

*С осторожностью*

Беременность, период лактации (грудное вскармливание).

### Способ применения и дозы:

Местно. Лекарственным средством пропитывают стерильные марлевые салфетки, которыми рыхло заполняют рану. Возможно введение в гнойные полости через катетер (дренажную трубку) с помощью шприца.

### Побочное действие:

*Аллергические реакции:* кожные высыпания.

### Применение при беременности и кормлении грудью:

Применение при беременности возможно в случае, если польза для матери превышает риск для плода.

В период лактации следует либо прекратить применение лекарственного средства, либо кормление грудью.

### Особые указания и меры предосторожности:

При нанесении на обширные участки кожи и длительных курсах лечения, необходимо проводить клинический анализ крови.

**Источник:** <http://drugs.thead.ru/Levomikon-Tff>