

Леворин



Код АТХ:

- [A07AX](#)

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Леворин](#)

Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#) [Апрель](#)
[Госреестр](#)^{МНН} [Википедия](#)^{МНН}
[PLC VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

Таблетки	1 таб.
леворин	500 тыс.ЕД

25 шт. - банки полимерные (1) - пачки картонные.

Фармакотерапевтическая группа:

- [Противомикробные, противопаразитарные и противоглистные средства](#)

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Полиеновый противогрибковый антибиотик. Благодаря большому числу сопряженных двойных связей обладает высокой тропностью к стероловым образованиям клеточной мембраны грибов. Связываясь с ними, индуцируя проницаемость мембраны, приводит к лизису клетки. Наибольшую активность проявляет в отношении *Candida albicans* и некоторых простейших (амебы, лейшмании, трихомонады).

Фармакокинетика

Практически не всасывается из ЖКТ и полностью выводится с каловыми массами.

Показания к применению:

Внутрь:

— кандидоз ЖКТ;

— кандидоносительство.

Местно:

— кандидоз слизистой оболочки полости рта;

— кандидоз половых органов у женщин (вульвовагинит, уретрит, цистит).

Относится к болезням:

- [Вульвит](#)
- [Уретрит](#)
- [Цистит](#)

Противопоказания:

— гиперчувствительность;

— печеночная и/или почечная недостаточность;

— острые негрибковые заболевания кишечника;

— язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки;

— панкреатит;

— беременность.

С осторожностью:

Период лактации, детский возраст (до 2 лет).

Способ применения и дозы:

Внутрь.

При кандидозе ЖКТ и кишечном кандидоносительстве взрослым назначают по 500 тыс. ЕД 2-4 раза в день в течение 10-12 дней.

Детям до 2 лет - по 25-30 тыс. ЕД/кг/сут, 2-6 лет - по 20-25 тыс. ЕД/кг/сут, **старше 6 лет** - по 200-250 тыс. ЕД 2-4 раза в день. Курс лечения - 7-14 дней, при необходимости повторяют через 5-7 дней (под контролем анализа крови). В случае появления тошноты или рвоты препарат применяют после еды.

Местно.

В виде водной взвеси (в разведении 1:500) назначают для полоскания полости рта 2-3 раза в день в течение 15-20 дней. Взвесь должна не попадать в органы дыхания. В виде такой же взвеси применяют леворин для смачивания тампонов при лечении заболеваний слизистых оболочек половых органов у женщин; курс лечения - 15-20 дней.

Побочное действие:

Аллергические реакции, снижение аппетита, тошнота, рвота, диарея, головная боль, местнораздражающее действие.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Применение препарата противопоказано при беременности. Применять с осторожностью в период лактации.

Особые указания и меры предосторожности:

При нарушениях функции почек

Леворин

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

Применение препарата противопоказано пациентам с почечной недостаточностью.

При нарушениях функции печени

Применение препарата противопоказано пациентам с печеночной недостаточностью.

Применение в детском возрасте

Применять с осторожностью детям до 2 лет.

Условия хранения:

Список Б. В сухом, защищенном от света, недоступном для детей месте, при температуре не выше +5°C.

Срок годности:

2 года.

Условия отпуска в аптеке:

По рецепту.

Источник: <http://drugs.thead.ru/Levorin>