

## Леворин



### Код АТХ:

- [A07AX](#)

### Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Леворин](#)

### Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)  
[Госреестр](#)<sup>МНН</sup> [Википедия](#)<sup>МНН</sup>  
[PLC VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)<sup>англ</sup>

### Форма выпуска:

<b>Таблетки</b>	<b>1 таб.</b>
леворин	500 тыс.ЕД

25 шт. - банки полимерные (1) - пачки картонные.

### Фармакотерапевтическая группа:

- [Противомикробные, противопаразитарные и противоглистные средства](#)

### Фармакологические свойства:

#### Фармакодинамика

Полиеновый противогрибковый антибиотик. Благодаря большому числу сопряженных двойных связей обладает высокой тропностью к стероловым образованиям клеточной мембраны грибов. Связываясь с ними, индуцируя проницаемость мембраны, приводит к лизису клетки. Наибольшую активность проявляет в отношении *Candida albicans* и некоторых простейших (амебы, лейшмании, трихомонады).

#### Фармакокинетика

Практически не всасывается из ЖКТ и полностью выводится с каловыми массами.

### Показания к применению:

*Внутрь:*

— кандидоз ЖКТ;

— кандидоносительство.

*Местно:*

— кандидоз слизистой оболочки полости рта;

— кандидоз половых органов у женщин (вульвовагинит, уретрит, цистит).

## Относится к болезням:

- [Вульвит](#)
- [Уретрит](#)
- [Цистит](#)

## Противопоказания:

— гиперчувствительность;

— печеночная и/или почечная недостаточность;

— острые негрибковые заболевания кишечника;

— язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки;

— панкреатит;

— беременность.

*С осторожностью:*

Период лактации, детский возраст (до 2 лет).

## Способ применения и дозы:

*Внутрь.*

При кандидозе ЖКТ и кишечном кандидоносительстве взрослым назначают по 500 тыс. ЕД 2-4 раза в день в течение 10-12 дней.

**Детям до 2 лет** - по 25-30 тыс. ЕД/кг/сут, 2-6 лет - по 20-25 тыс. ЕД/кг/сут, **старше 6 лет** - по 200-250 тыс. ЕД 2-4 раза в день. Курс лечения - 7-14 дней, при необходимости повторяют через 5-7 дней (под контролем анализа крови). В случае появления тошноты или рвоты препарат применяют после еды.

*Местно.*

В виде водной взвеси (в разведении 1:500) назначают для полоскания полости рта 2-3 раза в день в течение 15-20 дней. Взвесь должна не попадать в органы дыхания. В виде такой же взвеси применяют леворин для смачивания тампонов при лечении заболеваний слизистых оболочек половых органов у женщин; курс лечения - 15-20 дней.

## Побочное действие:

Аллергические реакции, снижение аппетита, тошнота, рвота, диарея, головная боль, местнораздражающее действие.

## Применение при беременности и кормлении грудью:

Применение препарата противопоказано при беременности. Применять с осторожностью в период лактации.

## Особые указания и меры предосторожности:

**При нарушениях функции почек**

## **Леворин**

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

---

Применение препарата противопоказано пациентам с почечной недостаточностью.

### ***При нарушениях функции печени***

Применение препарата противопоказано пациентам с печеночной недостаточностью.

### ***Применение в детском возрасте***

Применять с осторожностью детям до 2 лет.

## **Условия хранения:**

Список Б. В сухом, защищенном от света, недоступном для детей месте, при температуре не выше +5°C.

## **Срок годности:**

2 года.

## **Условия отпуска в аптеке:**

По рецепту.

**Источник:** <http://drugs.thead.ru/Levorin>