Леворин (мазь)



Код АТХ:

- A07AX

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- Леворин

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр[МНН] Википедия[МНН] Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Фармакотерапевтическая группа:

- Противомикробные, противопаразитарные и противоглистные средства

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Полиеновый противогрибковый антибиотик. Благодаря большому числу сопряженных двойных связей обладает высокой тропностью к стероловым образованиям клеточной мембраны грибов. Связываясь с ними, индуцируя проницаемость мембраны, приводит к лизису клетки. Наибольшую активность проявляет в отношении Candida albicans и некоторых простейших (амебы, лейшмании, трихомонады).

Фармакокинетика

Практически не всасывается из ЖКТ и полностью выводится с калом.

Показания к применению:

Внутрь: кандидоз ЖКТ, кандидоносительство.

Местно: кандидоз слизистой оболочки полости рта; кандидоз половых органов у женщин (вульвовагинит, уретрит, цистит).

Наружно: паронихии, межпальцевые эрозии, поражения складок кожи.

Относится к болезням:

- Вульвит
- Уретрит
- Цистит

Противопоказания:

Печеночная и/или почечная недостаточность, острые негрибковые заболевания кишечника, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, панкреатит; беременность.

Для интравагинального применения: менструальный период, метроррагия, беременность.

Повышенная чувствительность к активному веществу.

Способ применения и дозы:

Доза зависит от показаний, применяемой лекарственной формы, возраста пациента.

Побочное действие:

Со стороны пищеварительной системы: при приеме внутрь - ухудшение аппетита, тошнота, рвота, диарея.

Прочие: головная боль, местнораздражающее действие, аллергические реакции.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Противопоказан при беременности.

С осторожностью применять в период лактации.

Особые указания и меры предосторожности:

С осторожностью применять у детей в возрасте до 2 лет.

При гипертрофии предстательной железы леворин уменьшает дизурические явления, а в некоторых случаях и размеры аденомы. Считается, что возможно применение леворина в составе комплексной терапии при гипертрофии предстательной железы.

При нарушениях функции почек

Противопоказан при почечной недостаточности.

При нарушениях функции печени

Противопоказан при печеночной недостаточности.

Применение в детском возрасте

С осторожностью применять у детей в возрасте до 2 лет.

Источник: http://drugs.thead.ru/Levorin_maz